

**SITUACION DE MENINGITIS VIRAL**  
Chile, semanas 1 a 31 de 2006 (actualizado al 10/08/2006)

En agosto de 2005, se inició un brote de Meningitis Viral en la IX región, causado por el enterovirus *Echovirus 30*, único serotipo detectado hasta la fecha en varias regiones del país. Esta situación ha afectado durante el año en curso, desde la I a la X regiones.

A la semana actual, se han notificado 1.257 casos, lo que sumado a los casos del año 2005 acumula un total de 2.257. Se observa un descenso del brote en la mayoría de las regiones, incluyendo la III, V y RM; éstas presentan el mayor número de casos durante el año. Por otro lado, en la VIII región aparece un repunte de casos en la semana 28, luego de una disminución sostenida y, la IV Región, continúa notificando casos semanales, pero en baja cantidad.

En relación a las características de los casos, los más afectados son los hombres y el grupo entre 5 y 9 años, concentra el mayor riesgo.

**RESUMEN DE CASOS POR REGION DE OCURRENCIA**

Región	N° de Casos		Tasa acumulada Regional 2006 (por 100.000 hab.)	Observaciones
	2005	2006 (sem 31*)		
I. Tarapacá	0	101	21,0	Sin casos 2005. En esta región se inició el brote en la semana epidemiológica 13 y en aparente declinación en la semana 29 de 2006. Las comunas afectadas son Iquique (39 por cien mil hab.), Alto Hospicio (19 por cien mil hab.), Arica (10 por cien mil hab.) y Pozo Almonte (7 por cien mil hab.). Afectó principalmente a hombres (56%) y al grupo de 10-19 años (41%).
II. Antofagasta	0	26	4,7	Sin casos 2005. A partir de la semana 19, los casos se presentan en forma de brote, todos ocurridos en la ciudad de Antofagasta. Último caso detectado en la semana 30, luego de dos semana sin casos. Afecta principalmente a hombres (73%) y al grupo de 10-19 años (46%).
III. Atacama	2	113	42,2	El brote se inició en la semana 52 del año 2005 y se extendió hasta la semana 4 año 2006, con 7 casos; sumados los reportados entre las semanas 15 y 31 del año 2006, presentan un total acumulado de 115 casos. El brote está aparentemente en fase de declinación. Afecta principalmente a hombres (67%) y el grupo de mayor riesgo es el de 5-9 años (304 por cien mil hab. en hombres y 144 en mujeres).
IV. Coquimbo	15	24	3,2	El brote se inició la semana 46 del año 2005, manteniendo los casos hasta enero 2006. Este año, el brote reaparece a partir del mes de abril, presentándose 1 o 2 casos por semana de notificación en forma continua.
V. Valparaíso	63	364	26,3	El brote mantiene una tendencia al descenso, a partir de la semana 22 y, especialmente en las últimas 4 semanas. Quillota continúa con el riesgo más alto (75 por 100.000 hbtes.), de un total de 17 comunas afectadas. Afecta principalmente a hombres (61%) y al grupo de 5-9 años (40%).
RM. Metropolitana	250	446	10,6	El brote en la RM se ha mantenido ininterrumpidamente desde el año 2005 (semana 40) en adelante; anteriormente sólo casos aislados. En la actualidad se observa un segundo ciclo del brote, con una disminución significativa de casos las últimas 3 semanas. Afecta principalmente a hombres (62%) y al grupo de 5-9 años (36%).
VI. Libertador	66	5	0,6*	En esta región se inició el brote en e año 2005. Entre la semana 27 y 29, reaparece un nuevo brote, reportando sólo 5 casos y sin registrar nuevos en las últimas 3 semanas.
VII. Maule	0	13	1,3	Sin casos 2005. Los casos corresponden a clusters (con 2 casos cada uno y sin nexo entre ellos) y casos aislados (última información disponible semana 29).
VIII. Bio-Bio	37	131	8,5	El brote se inició la semana 40 del año 2005. Entre las semanas 24 a la 27 del año 2006, se observó una tendencia al descenso, sin embargo, se presentó un repunte en la semana 28 y luego un caso aislado en la semana 30. Afecta principalmente a hombres (58%) y al grupo de 5-9 años (50%).
IX. Araucanía	516	29	3,1*	El brote se inició en agosto de 2005 y se prolongó hasta diciembre del mismo año. En la semana 18 de este año, reaparecen los casos, acumulando 29 a la fecha. En la semana 29 no se registraron casos (última información disponible semana 29).
X. Los Lagos	51	5	0,4*	En esta región se presentó el primer brote entre los meses de noviembre y diciembre 2005. Reaparece en el mes de agosto, presentado sólo casos aislados. Último caso reportado en la semana 28.
XI. Aysén	0	0	0,0	SIN CASOS
XII. Magallanes	0	0	0,0	
Total País	1.000	1.257		Total acumulado 2.256

Nota: cálculo de tasas acumuladas desde el año 2005, período de inicio del brote.  
(\*) Cálculo sólo año 2006 (resurgimiento de un nuevo brote).