


SITUACION DE MENINGITIS VIRAL (actualizado al 20/02/2007)

En agosto de 2005 se inició un brote de Meningitis Viral en la IX región. Este brote, ha afectado desde el 2005 hasta el año en curso, desde la I a la X región.

Desde su inicio se han notificado a la fecha: 1.107 casos el 2005, 2207 el 2006 y 50 hasta la semana 5 de 2007, con lo cual se tiene un total acumulado de 3.364. El grupo más afectado sigue siendo el de los hombres, con distribución etarea entre los 5 y 9 años.

A nivel regional, la región metropolitana que se ha mantenido en brote desde el 2005, continúa presentando un alto número de casos semanales, pero con un aparente descenso.

El agente causal identificado hasta ahora había sido el Echovirus 30 principalmente entre las regiones V y X. Además el ISP a fines del año pasado, aisló el Echovirus 4 en las regiones del norte, y un caso aislado de Echovirus 20 en la III Región



RESUMEN DE CASOS POR REGION DE OCURRENCIA

Región	N° de Casos		OBSERVACIONES	GRÁFICO
	2005 y 2006	16/02/2007 (a Sem. 5)		
I.	103	0	<p>Sin casos 2005. El brote se produce entre las semanas 13 y 29 de 2006, y un caso aislado la semana 47 del mismo año. Las comunas afectadas fueron Iquique (39 por cien mil hab.), Alto Hospicio (19 por cien mil hab.), Arica (10 por cien mil hab.) y Pozo Almonte (7 por cien mil hab.). Afectó principalmente a hombres (56%) y al grupo de 10-19 años (41%).</p> <p>Etapa Actual del Brote: Finalizado</p>	<p style="text-align: center;">Casos de Meningitis Viral por semana de Notificación. I Región, Semana 13 de 2006 a 6 de 2007</p>
II.	26	0	<p>Sin casos 2005. Entre las semanas 19 y 30 se presentó el brote en la II Región, de menor magnitud que en la I Región. Afectó principalmente a la ciudad de Antofagasta, a hombres (73%) y al grupo de 10-19 años (46%). Posterior a ésta fecha no se han notificado nuevos casos.</p> <p>Etapa Actual del Brote: Finalizado</p>	<p style="text-align: center;">Casos de Meningitis Viral por semana de Notificación. II Región, Semana 13 de 2006 a 5 de 2007</p>
III.	258	9	<p>El brote se inició en la semana 52- 2005 y se reinicia a partir de la semana 15 y se mantiene todo el año. El brote presenta un tercer ciclo, este último de menor magnitud. La larga existencia del virus pudiera deberse a la presencia de mas de un serotipo circulante. Hasta la semana epidemiológica 5 del 2007 se notifican casos aislados (2 casos semanales).</p> <p>Etapa Actual del Brote: En Declinación</p>	<p style="text-align: center;">Casos de Meningitis Viral por semana de Notificación. III Región, Semana 50 de 2005 a 5 de 2007.</p>
IV.	134	14	<p>El brote se inició la semana 46 del año 2005, hasta enero 2006. El 2006, reaparece a partir del mes de abril, presentando entre un bajo número de casos. Desde la semana 43 se presenta un aumento sostenido de casos, llegando a un peak en la semana 46 con 28 casos en Ovalle. La investigación determinó como agente causal enterovirus, y la cepa aislada fue ECHO-4, al igual que en otras ciudades del norte del país. En la semana 1 de 2007, se registraron 7 casos nuevos, y posteriormente entre 0 y 2 casos semanales.</p> <p>Etapa Actual del Brote: En Declinación</p>	<p style="text-align: center;">Casos de Meningitis Viral por semana de notificación. IV Región, semanas 49 de 2005 a 5 de 2007.</p>
V.	530	5	<p>El brote se inicia a partir de la semana 45 (2005) y se mantuvo todo el año en forma ininterrumpida, con una presentación en 3 ciclos, el último de ellos de menor magnitud. En la actualidad se mantiene la actividad epidémica, aunque en forma más aislada (promedio 1 – 2 casos semanales notificados)</p> <p>Afecta principalmente a hombres (60%) y al grupo de 5-9 años (39%), seguido por el de 10-19 años.</p> <p>Etapa Actual del Brote: En Declinación</p>	<p style="text-align: center;">Casos de Meningitis Viral por semana de notificación. V Región, semana 49 de 2005 a 5 de 2007.</p>

RM.	1299	18	<p>El brote se inicia en la semana 42 (2005) y, al igual que la V Región, se ha mantenido ininterrumpidamente.</p> <p>En la actualidad, se observa la aparición de un tercer ciclo del brote, de similar intensidad que los anteriores. Sin embargo la casuística de la notificación disminuye hasta la semana 4 en la que sólo se presentan 4 casos en toda la región</p> <p>Etapa Actual del Brote: En descenso</p>	<p>Casos de Meningitis Viral por semana de notificación. Región Metropolitana, semana 3 de 2005 a 05 de 2007.</p>
VI.	66	1	<p>En esta región se inició el brote en el año 2005, con aparición de casos hasta la semana 3 del 2006 y un total de 71 casos. A partir de la semana 27 reaparece un nuevo brote de menor magnitud, reportando sólo 8 casos. El último caso reportó en la semana 44 en forma aislada. Desde esa fecha hasta la 5 del 2007 sólo se ha reportado un caso aislado.</p> <p>Estado Actual del Brote: Finalizado</p>	<p>Casos de Meningitis Viral por semana de notificación. VI Región, semana 49 de 2005 a 5 de 2007.</p>
VII.	27	0	<p>Sin casos 2005. El brote se inicia en la semana 21 (2006) y se mantiene hasta la semana 47 con 2 casos semanales.</p> <p>Afecta principalmente a hombres (65%) y al grupo entre 5 y 9 años (60%).</p> <p>El 2007, al menos hasta la semana 5, no se han notificado nuevos casos.</p> <p>Estado Actual del Brote: Finalizado</p>	<p>Casos de Meningitis Viral por semana de Notificación. VII Región, Semana 21 de 2006 a 5 de 2007</p>
VIII.	265	1	<p>El brote que se inició en la semana 40 del año 2005, se mantuvo todo el 2006, con tendencia a disminuir hacia fines de éste año. Aún así la notificación se mantiene hasta la semana 5 del 2007. Llama la atención la presencia de ciclos de brotes, pero de menor intensidad, manteniéndose estacionario las últimas semanas del 2006, así como las primeras del 2007.</p> <p>Afecta principalmente a hombres (57%) y al grupo de 5-9 años (68%).</p> <p>Estado Actual del Brote: En declinación</p>	<p>Casos de Meningitis Viral por semana epidemiológica de notificación. Región del Bio-Bio, semana 49 de 2005 a 5 de 2007</p>
IX.	545	0	<p>Fue la primera región en iniciar el brote (agosto de 2005) y se prolongó hasta diciembre del mismo año. En el 2006, en la semana 18, reaparece un pequeño brote, con 29 casos a la fecha. A partir de la semana 29 del 2006 no se han registrado nuevos casos.</p> <p>Estado Actual del Brote: Finalizado</p>	<p>Meningitis Viral por semana de Notificación. IX Región, Semanas 39 de 2005 a 4 de 2007</p>
X.	61	2	<p>En la ciudad de Valdivia se presentó el primer brote entre los meses de noviembre de 2005 y duró hasta la semana 3 de 2006. Posteriormente se reportó un brote en Osorno, de menor magnitud y duración.</p> <p>Hacia fines del 2006 aparece un nuevo brote en la ciudad de Puerto Montt en la semana 39 (pendiente reporte). Sin embargo hasta la semana 6 de 2007 solo se han notificado dos casos aislados.</p> <p>Estado Actual del Brote: En Declinación?</p>	<p>Casos de Meningitis Viral por semana epidemiológica de notificación. X Región, semana 46 de 2005 a 5 de 2007</p>
Total	3.314	50		