



GOBIERNO DE CHILE  
MINISTERIO DE SALUD

# EVOLUCION DEL VIH-SIDA REGION METROPOLITANA, 1987-2006

Departamento de Epidemiología  
Diciembre 2007



# EVOLUCION DEL VIH-SIDA

## REGION METROPOLITANA, 1987-2006

Los primeros casos de VIH-SIDA se presentaron en 1985, un año después de los primeros casos en el país (1984). Entre 1990 y 2005 han muerto 3.252 personas por SIDA y hasta el 31 diciembre 2006, se han notificado 10.272 casos de VIH o SIDA. En este informe se presenta:



- a) La situación de la mortalidad por SIDA desde 1990 a 2005 (último año disponible), información proveniente de los certificados de defunción.
- b) El análisis de la incidencia, medida a través de las notificaciones realizadas por la Región entre 1987 y 2006.

### I. MORTALIDAD SIDA, 1990 - 2005

Entre 1990 y 2005 se produjeron en la región 3.252 defunciones por SIDA<sup>1</sup>, correspondiendo el 88% de ellas a hombres.


La Región Metropolitana ha mantenido tasas de mortalidad muy por encima del promedio nacional, ocupando en el 2005 el segundo lugar después de la Región de Tarapacá.

Se observa un aumento progresivo de la mortalidad hasta 1997, oscilando posteriormente hasta el 2001 (siendo el 1999 el año que muestra la tasa más alta del período con 5 muertes por 100.000 hab.), a partir de ese momento se observa un descenso progresivo, llegando el 2005 a una



<sup>1</sup> Considerando como tales los Códigos CIE-9 (hasta 1996): 279.5, 279.6 y 279.7 y CIE-10 (desde 1997): B20-B24

tasa de 3,2 por 100.000. El comportamiento de mujeres y hombres es muy similar, sin embargo en el año 2005 la tasa en hombres descendió a 3.2 por cien mil. Las tasas más elevadas de mortalidad por SIDA se concentran en hombres entre los 30 y 60 años.



**MORTALIDAD POR SIDA SEGÚN SEXO Y RAZÓN H:M  
REGIÓN METROPOLITANA 1990-2005**

Fuente DEIS, MINSAL 2007

| Año  | AMBOS SEXOS |       | HOMBRES |       | MUJERES |       | Razón H:M |
|------|-------------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------|
|      | Nº DEF.     | TASA* | Nº DEF. | TASA* | Nº DEF. | TASA* |           |
| 1990 | 47          | 0,9   | 44      | 1,8   | 3       | 0,1   | 15        |
| 1991 | 49          | 0,9   | 49      | 1,9   | 0       | 0,0   | 0         |
| 1992 | 79          | 1,5   | 72      | 2,8   | 7       | 0,3   | 10        |
| 1993 | 106         | 1,9   | 100     | 3,7   | 6       | 0,2   | 17        |
| 1994 | 173         | 3,1   | 161     | 5,9   | 12      | 0,4   | 13        |
| 1995 | 205         | 3,6   | 189     | 6,8   | 16      | 0,5   | 12        |
| 1996 | 245         | 4,2   | 218     | 7,7   | 27      | 0,9   | 8         |
| 1997 | 277         | 4,7   | 244     | 8,7   | 33      | 1,1   | 7         |
| 1998 | 245         | 4,1   | 220     | 7,6   | 25      | 0,8   | 9         |
| 1999 | 303         | 5,0   | 275     | 9,3   | 28      | 0,9   | 10        |
| 2000 | 274         | 4,4   | 247     | 8,2   | 27      | 0,9   | 9         |
| 2001 | 320         | 5,1   | 272     | 8,9   | 48      | 1,5   | 6         |
| 2002 | 269         | 4,3   | 235     | 7,6   | 34      | 1,0   | 7         |
| 2003 | 232         | 3,6   | 196     | 6,3   | 36      | 1,1   | 5         |
| 2004 | 220         | 3,4   | 200     | 6,3   | 20      | 0,6   | 10        |
| 2005 | 208         | 3,2   | 176     | 5,5   | 32      | 1,0   | 6         |

1 CIE-9 (hasta 1996) : 279.5, 279.6, 279.7; CIE-10 (desde 1997) : B20-B24

\* Tasa por cien mil habitantes

## NOTIFICACIONES POR VIH Y SIDA

Entre 1984 y 2006 se han notificado 10.272 personas viviendo con VIH o SIDA. Para el análisis consistente de la evolución de algunas variables, se agruparon los casos en 4 quinquenios correspondientes a los períodos 1987-1991, 1992-1997, 1998-2001, 2002-2006, dejando fuera los 33 casos ocurridos en 1984 y 1986. El 53% (5.337 casos) están notificados como VIH y el 47% (4.810 casos) como SIDA; 125 personas no tienen información sobre la etapa diagnóstica. Por lo tanto, cuando en el análisis se desagrega por esta variable, se trabaja sobre un total de 10.114 personas.


### 1. Tendencia 1987 -2006

**SIDA:** La tasa de notificación mostró un aumento importante en el año 1989 manteniéndose desde entonces sobre la tasa nacional. A partir del año 1994, se observa una estabilización de la notificación y posteriormente una tendencia a la disminución, llegando el año 2006 a una tasa de 3,0 por 100 mil habitantes.


**VIH:** Se observa un aumento sostenido, llegando en el 2003 a la tasa más alta del período (8,6 por cien mil), cifra que llega a más del doble de la tasa nacional. A partir del año 1993 se supera la tasa nacional esta situación se mantiene hasta el año 2005.

La Región Metropolitana ocupa el segundo lugar en el país en la tasa de notificación por VIH (92.1 por cien mil hab.) como SIDA (83.0 por cien mil hab.)

Tasa de Notificación de casos de SIDA.  
Región Metropolitana y total país, 1984-2006.



Tasa de Notificación de casos de VIH.  
Región Metropolitana y total país, 1984-2006.




**Notificaciones por VIH y SIDA  
en la Región Metropolitana, 1987-2006**

| Año  | VIH |       | SIDA |       |
|------|-----|-------|------|-------|
|      | Nº  | Tasa* | Nº   | Tasa* |
| 1984 | 0   | 0,0   | 3    | 0,0   |
| 1985 | 0   | 0,0   | 9    | 0,2   |
| 1986 | 6   | 0,1   | 15   | 0,3   |
| 1987 | 10  | 0,2   | 40   | 0,8   |
| 1988 | 29  | 0,6   | 60   | 1,2   |
| 1989 | 50  | 1,0   | 96   | 1,9   |
| 1990 | 86  | 1,7   | 178  | 3,4   |
| 1991 | 134 | 2,5   | 249  | 4,7   |
| 1992 | 140 | 2,6   | 260  | 4,8   |
| 1993 | 194 | 3,5   | 255  | 4,6   |
| 1994 | 185 | 3,3   | 290  | 5,2   |
| 1995 | 201 | 3,5   | 292  | 5,1   |
| 1996 | 279 | 4,8   | 310  | 5,3   |
| 1997 | 310 | 5,3   | 306  | 5,2   |
| 1998 | 342 | 5,7   | 310  | 5,2   |
| 1999 | 366 | 6,0   | 303  | 5,0   |
| 2000 | 389 | 6,3   | 278  | 4,5   |
| 2001 | 371 | 5,9   | 263  | 4,2   |
| 2002 | 505 | 8,0   | 288  | 4,6   |
| 2003 | 560 | 8,8   | 288  | 4,5   |
| 2004 | 427 | 6,6   | 265  | 4,1   |
| 2005 | 400 | 6,1   | 253  | 3,9   |
| 2006 | 353 | 5,3   | 199  | 3,0   |

\* Tasa por cien mil habitantes


## 2. Distribución geográfica

Las regiones de Tarapacá, Metropolitana y de Valparaíso muestran las tasas acumuladas más altas en el período, tanto en VIH como en SIDA. La región con la tasa más baja de todo el país, para el SIDA, es Aysén. Mientras que la región con la tasa más baja de VIH es Araucanía.



## 3. Distribución de personas con VIH-SIDA por sexo.

El análisis de los casos acumulados en el período 1987-2006, muestra que en todos los quinquenios el número de casos de hombres supera al de mujeres, tanto en SIDA como en VIH. El 87% de los casos notificados en la región son hombres. Sin embargo, en los dos últimos quinquenios la proporción de mujeres ha aumentado, especialmente en VIH.




#### 4. Distribución de personas con VIH-SIDA por edad.

La distribución por edad muestra algunas diferencias entre los casos notificados como SIDA y como VIH.

**SIDA:** La tasa más alta está entre los 30 y 39 años, seguida por los 40-49 años.

**VIH:** La tasa más alta también se presenta en el mismo grupo edad que el SIDA. sin embargo, le sigue el grupo del 20-29 años.

Tasa acumulada de notificaciones por SIDA y VIH según edad  
Región Metropolitana, 1987-2006



Tasa acumulada de notificación por VIH y SIDA según grupos de edad y sexo.  
Región Metropolitana, 1987-2006

| Edad     | VIH     |       |         |       |       |       | SIDA    |       |         |       |       |       |
|----------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|
|          | Hombres |       | Mujeres |       | Total |       | Hombres |       | Mujeres |       | Total |       |
|          | Nº      | Tasa* | Nº      | Tasa* | Nº    | Tasa* | Nº      | Tasa* | Nº      | Tasa* | Nº    | Tasa* |
| 0-9      | 23      | 4,0   | 33      | 6,0   | 56    | 5,0   | 38      | 6,6   | 25      | 4,5   | 63    | 5,6   |
| 10-19    | 103     | 20,6  | 42      | 8,5   | 145   | 14,6  | 53      | 10,6  | 13      | 2,6   | 66    | 6,7   |
| 20-29    | 1607    | 318,2 | 293     | 57,9  | 1900  | 187,9 | 1120    | 221,8 | 137     | 27,1  | 1257  | 124,3 |
| 30-39    | 1722    | 351,0 | 304     | 60,4  | 2026  | 203,8 | 1682    | 342,8 | 144     | 28,6  | 1826  | 183,7 |
| 40-49    | 686     | 199,0 | 117     | 31,4  | 803   | 111,9 | 900     | 261,0 | 96      | 25,8  | 996   | 138,8 |
| 50-59    | 246     | 109,1 | 59      | 22,9  | 305   | 63,1  | 379     | 168,0 | 41      | 15,9  | 420   | 86,9  |
| 60-69    | 69      | 50,7  | 11      | 6,3   | 80    | 25,7  | 120     | 88,2  | 24      | 13,7  | 144   | 46,2  |
| 70 y más | 18      | 19,7  | 4       | 2,5   | 22    | 8,7   | 32      | 35,0  | 6       | 3,7   | 38    | 15,1  |
| Total    | 4474    | 156,1 | 863     | 28,5  | 5337  | 90,6  | 4324    | 150,8 | 486     | 16,1  | 4810  | 81,7  |

\*Tasa por cien mil habitantes

125 casos sin registro de etapa

Tasa de notificaciones por grupos de edad y quinquenio.

Región Metropolitana, 1987-2006

| Edad     | 1987-1991 |       | 1992-1996 |       | 1997-2001 |       | 2002-2006 |       | Total |       |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|          | Nº        | tasa* | Nº        | tasa* | Nº        | tasa* | Nº        | tasa* | Nº    | tasa* |
| 0-9      | 11        | 0     | 34        | 0     | 37        | 3,3   | 40        | 3,9   | 122   | 10,7  |
| 10-19    | 31        | 3,4   | 47        | 5,1   | 63        | 6,0   | 71        | 6,3   | 212   | 22,0  |
| 20-29    | 356       | 36,2  | 841       | 83,0  | 947       | 93,9  | 1044      | 100,7 | 3188  | 314,8 |
| 30-39    | 304       | 39,5  | 889       | 94,6  | 1329      | 130,7 | 1351      | 132,6 | 3873  | 394,1 |
| 40-49    | 151       | 28,0  | 393       | 61,5  | 556       | 71,6  | 726       | 78,4  | 1826  | 265,4 |
| 50-59    | 50        | 13,7  | 139       | 32,2  | 245       | 47,0  | 297       | 48,6  | 731   | 157,3 |
| 60-69    | 23        | 9,2   | 52        | 17,9  | 57        | 17,6  | 93        | 24,2  | 225   | 73,7  |
| 70 y más | 7         | 3,7   | 13        | 5,8   | 16        | 5,9   | 26        | 8,0   | 62    | 25,6  |
| Total    | 933       | 18,5  | 2408      | 43,0  | 3250      | 53,5  | 3648      | 56,4  | 10239 | 176,6 |

(\*) por cien mil habitantes entre primer y último quinquenio


33 casos sin fecha de notificación

## 5. Distribución de personas con VIH-SIDA por nivel de escolaridad.


Según nivel de escolaridad se aprecia que los porcentajes de educación media y superior son más altos que los observados en la población general.

Los casos de VIH muestran una mayor proporción de personas con educación media y básica, mientras que entre los casos SIDA hay mayor proporción de personas con educación media y superior.


Casos de SIDA según nivel de escolaridad, Región Metropolitana 1987-2006



Casos de VIH según nivel de escolaridad, Región Metropolitana 1987-2006



Distribución porcentual según escolaridad de la población general. Chile 2002 (censo)



**Casos de VIH y SIDA según nivel de escolaridad y quinquenio.**

**Región Metropolitana 1987-2006**

| Etapa | Escolaridad | 1987-1991 |       | 1992-1996 |       | 1997-2001 |       | 2002-2006 |       | Total |       |
|-------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|       |             | Nº        | %     | Nº        | %     | Nº        | %     | Nº        | %     | Nº    | %     |
| SIDA  | Básica      | 135       | 21,7  | 344       | 24,4  | 359       | 24,6  | 218       | 16,9  | 1056  | 22,1  |
|       | Media       | 302       | 48,5  | 683       | 48,5  | 702       | 48,1  | 595       | 46,0  | 2282  | 47,7  |
|       | Superior    | 130       | 20,9  | 248       | 17,6  | 263       | 18,0  | 280       | 21,7  | 921   | 19,3  |
|       | Ninguna     | 12        | 1,9   | 33        | 2,3   | 24        | 1,6   | 30        | 2,3   | 99    | 2,1   |
|       | Desconocido | 44        | 7,1   | 99        | 7,0   | 112       | 7,7   | 170       | 13,1  | 425   | 8,9   |
|       | Total       | 623       | 100,0 | 1407      | 100,0 | 1460      | 100,0 | 1293      | 100,0 | 4783  | 100,0 |

|     |             |     |       |     |       |      |       |      |       |      |       |
|-----|-------------|-----|-------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| VIH | Básica      | 57  | 18,4  | 199 | 19,9  | 327  | 18,4  | 345  | 15,4  | 928  | 17,4  |
|     | Media       | 142 | 46,0  | 475 | 47,5  | 921  | 51,8  | 1122 | 50,0  | 2660 | 49,9  |
|     | Superior    | 80  | 25,9  | 219 | 21,9  | 395  | 22,2  | 621  | 27,7  | 1315 | 24,7  |
|     | Ninguna     | 2   | 0,6   | 16  | 1,6   | 28   | 1,6   | 28   | 1,2   | 74   | 1,4   |
|     | Desconocido | 28  | 9,1   | 90  | 9,0   | 107  | 6,0   | 129  | 5,7   | 354  | 6,6   |
|     | Total       | 309 | 100,0 | 999 | 100,0 | 1778 | 100,0 | 2245 | 100,0 | 5331 | 100,0 |

VIH : 125 casos sin registro de etapa diagnóstica + 6 sin fecha de diagnóstico

SIDA 27 casos sin fecha de diagnóstico

**Casos de VIH/SIDA según nivel de escolaridad, quinquenio y sexo.**

**Región Metropolitana 1987-2006**

| Sexo    | Escolaridad | 1987-1991 |       | 1992-1996 |       | 1997-2001 |       | 2002-2006 |       | Total |       |
|---------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|         |             | Nº        | %     | Nº        | %     | Nº        | %     | Nº        | %     | Nº    | %     |
| Mujeres | Básica      | 25        | 29,4  | 108       | 37,4  | 156       | 33,9  | 166       | 31,1  | 455   | 33,3  |
|         | Media       | 38        | 44,7  | 109       | 37,7  | 201       | 43,7  | 242       | 45,3  | 590   | 43,1  |
|         | Superior    | 12        | 14,1  | 25        | 8,7   | 47        | 10,2  | 52        | 9,7   | 136   | 9,9   |
|         | Ninguna     | 5         | 5,9   | 25        | 8,7   | 21        | 4,6   | 25        | 4,7   | 76    | 5,6   |
|         | Desconocido | 5         | 5,9   | 22        | 7,6   | 35        | 7,6   | 49        | 9,2   | 111   | 8,1   |
|         | Total       | 85        | 100   | 289       | 100   | 460       | 100,0 | 534       | 100,0 | 1368  | 100,0 |
| Hombres | Básica      | 167       | 19,7  | 435       | 20,5  | 530       | 19,0  | 410       | 13,2  | 1542  | 17,4  |
|         | Media       | 407       | 48,0  | 1050      | 49,6  | 1427      | 51,1  | 1536      | 49,3  | 4420  | 49,8  |
|         | Superior    | 198       | 23,3  | 443       | 20,9  | 616       | 22,1  | 877       | 28,2  | 2134  | 24,1  |
|         | Ninguna     | 9         | 1,1   | 24        | 1,1   | 32        | 1,1   | 36        | 1,2   | 101   | 1,1   |
|         | Desconocido | 67        | 7,9   | 167       | 7,9   | 185       | 6,6   | 255       | 8,2   | 674   | 7,6   |
|         | Total       | 848       | 100,0 | 2119      | 100,0 | 2790      | 100,0 | 3114      | 100,0 | 8871  | 100,0 |

En general, tanto en hombres como en mujeres, la mayor proporción de personas tiene enseñanza media en todos los quinquenios; este porcentaje es superior en los hombres, llegando casi al 50% de ellos. La proporción de hombres con enseñanza superior también supera a las mujeres, mientras que éstas tienen un porcentaje superior con enseñanza básica.


## 6. Distribución de personas con VIH-SIDA por vía de exposición al virus.

En la Región Metropolitana, la principal vía de exposición al virus es la sexual (91%). siendo la vía homosexual la más declarada (48.3%). En alrededor de un 5% de los casos se desconoce la vía de exposición.

**SIDA:** En los últimos tres quinquenio, las vías de exposición homosexual y bisexual se han mantenido relativamente similares, La vía heterosexual registra cifras ascendentes. Las vías de exposición transfusional, hemofílico y uso de drogas intravenosa han descendido; mientras que la vía de transmisión vertical se ha mantenido relativamente estable entre 1,5 y 1,2%.

**VIH:** En el último quinquenio las vías de transmisión homosexual y heterosexual registran incremento. Se observa que la vía de transmisión bisexual, se ha mantenido en descenso en todos los quinquenios.

Distribución porcentual de casos de VIH-SIDA por vía de exposición Región Metropolitana, 1987-2006




Casos de VIH y SIDA según vía de exposición según etapa y quinquenio. Región Metropolitana 1987-2006

| Etapa | Factor de exposición | 1987-1991 |       | 1992-1996 |       | 1997-2001 |       | 2002-2006 |       | Total |       |
|-------|----------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|       |                      | Nº        | %     | Nº        | %     | Nº        | %     | Nº        | %     | Nº    | %     |
| SIDA  | Homosexual           | 321       | 47,9  | 693       | 47,2  | 656       | 43,8  | 542       | 41,8  | 2212  | 44,8  |
|       | Bisexual             | 136       | 20,3  | 205       | 14,0  | 200       | 13,4  | 170       | 13,1  | 711   | 14,4  |
|       | Heterosexual         | 110       | 16,4  | 373       | 25,4  | 500       | 33,4  | 465       | 35,9  | 1448  | 29,4  |
|       | Usuario Drogas       | 30        | 4,5   | 68        | 4,6   | 41        | 2,7   | 12        | 0,9   | 151   | 3,1   |
|       | Transfusional        | 18        | 2,7   | 6         | 0,4   | 4         | 0,3   | 2         | 0,2   | 30    | 0,6   |
|       | Hemofílico           | 7         | 1,0   | 5         | 0,3   | 1         | 0,1   | 0         | 0,0   | 13    | 0,3   |
|       | Vertical             | 10        | 1,5   | 21        | 1,4   | 14        | 0,9   | 16        | 1,2   | 61    | 1,2   |
|       | Desconocido          | 38        | 5,7   | 97        | 6,6   | 82        | 5,5   | 89        | 6,9   | 306   | 6,2   |
|       | Total                | 670       | 100,0 | 1468      | 100,0 | 1498      | 100,0 | 1296      | 100,0 | 4932  | 100,0 |
| VIH   | Homosexual           | 161       | 49,1  | 511       | 47,9  | 944       | 52,2  | 1179      | 52,9  | 2795  | 51,5  |
|       | Bisexual             | 48        | 14,6  | 131       | 12,3  | 198       | 10,9  | 222       | 10,0  | 599   | 11,0  |
|       | Heterosexual         | 82        | 25,0  | 285       | 26,7  | 552       | 30,5  | 720       | 32,3  | 1639  | 30,2  |
|       | Usuario Drogas       | 18        | 5,5   | 74        | 6,9   | 35        | 1,9   | 8         | 0,4   | 135   | 2,5   |
|       | Transfusional        | 4         | 1,2   | 8         | 0,7   | 1         | 0,1   | 1         | 0,0   | 14    | 0,3   |
|       | Hemofílico           | 3         | 0,9   | 0         | 0,0   | 4         | 0,2   | 0         | 0,0   | 7     | 0,1   |
|       | Vertical             | 1         | 0,3   | 9         | 0,8   | 23        | 1,3   | 19        | 0,9   | 52    | 1,0   |
|       | Desconocido          | 11        | 3,4   | 49        | 4,6   | 53        | 2,9   | 78        | 3,5   | 191   | 3,5   |
|       | Total                | 328       | 100,0 | 1067      | 100,0 | 1810      | 100,0 | 2227      | 100,0 | 5432  | 100,0 |


## 7. Distribución de personas con VIH-SIDA por etapa diagnóstica en la primera notificación.

Del total de casos de VIH-SIDA notificados en la Región Metropolitana entre 1987 y 2006 (10.272), el 52% se notificó en etapa diagnóstica de VIH, mientras que el 47% fue notificado ya en etapa de SIDA. El 1% no tiene registro de la etapa diagnóstica.

Distribución de casos de VIH-SIDA en mujeres por etapa diagnóstica en la 1ª notificación, Región Metropolitana 1987-2006



Distribución de casos de VIH-SIDA en hombres por etapa diagnóstica en la 1ª notificación, Región Metropolitana 1987-2006



El porcentaje de mujeres que es notificada en etapa VIH es superior a los hombres en todos los quinquenios. Esto se podría deber a que las mujeres tienen más acceso a la oferta del examen, a través del control de salud sexual, control de embarazo, paternidad responsable, entre otros.

Casos de VIH/SIDA según Diagnóstico de ingreso, sexo y quinquenio.  
Región Metropolitana 1987-2006

| Sexo    | Diagnóstico Ingreso | 1987-1991 |         | 1992-1996 |        | 1997-2001 |       | 2002-2006 |       | Total |       |
|---------|---------------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|         |                     | Nº        | %       | Nº        | %      | Nº        | %     | Nº        | %     | Nº    | %     |
| Mujeres | VIH                 | 39        | 45,8824 | 144       | 49,827 | 299       | 65,0  | 381       | 74,1  | 863   | 64,0  |
|         | SIDA                | 46        | 54,1176 | 145       | 50,173 | 161       | 35,0  | 133       | 25,9  | 485   | 36,0  |
|         | Total               | 85        | 100     | 289       | 100    | 460       | 100,0 | 514       | 100,0 | 1348  | 100,0 |
| Hombres | VIH                 | 270       | 31,9    | 855       | 40,4   | 1479      | 53,2  | 1864      | 61,6  | 4468  | 51,0  |
|         | SIDA                | 577       | 68,1    | 1262      | 59,6   | 1299      | 46,8  | 1160      | 38,4  | 4298  | 49,0  |
|         | Total               | 847       | 100,0   | 2117      | 100,0  | 2778      | 100,0 | 3024      | 100,0 | 8766  | 100,0 |

VIH : 125 casos sin registro de etapa diagnóstica + 6 sin fecha de diagnóstico

SIDA 27 casos sin fecha de diagnóstico

## SÍNTESIS:

- Entre 1990 y 2005 han muerto 3.252 personas por SIDA y hasta el 31 diciembre 2006.
- La Región Metropolitana ha mantenido tasas de mortalidad muy por encima del promedio nacional, ocupando en el 2005 el segundo lugar.
- Se observa un aumento progresivo de la mortalidad, siendo el 1999 el año que registra la tasa más alta del período con 5 muertes por 100.000 hab.
- En el 2005 se registra una tasa de mortalidad de 3,2 por 100.000. El comportamiento de mujeres y hombres es muy similar, sin embargo en el año 2005 la tasa en hombres descendió a 3.2 por cien mil.
- Las tasas más elevadas de mortalidad por SIDA se concentran en hombres entre los 30 y 60 años.
- Entre los años 1984 y 2006 se han notificado 10.272 personas viviendo con VIH o SIDA, el 52% de los casos se notificó en etapa diagnóstica de VIH, mientras que el 47% fue notificado ya en etapa de SIDA.
- La Región Metropolitana ocupa el segundo lugar en el país en la tasa de notificación por VIH (92.1 por cien mil hab.) y por SIDA (83.0 por cien mil hab.).
- El análisis de los casos acumulados en el período 1987-2006, muestra que en todos los quinquenios el número de casos de hombres supera al de mujeres, tanto en SIDA como en VIH.
- El 87% de los casos notificados en la región son hombres.
- Según nivel de escolaridad se aprecia que los porcentajes de educación media y superior son más altos que los observados en la población general.
- La principal vía de exposición al virus es la sexual (91%). siendo la vía homosexual la más declarada (48.3%).
- En alrededor de un 5% de los casos se desconoce la vía de exposición.