

GOBIERNO DE CHILE  
MINISTERIO DE SALUD

# EVOLUCION DEL VIH-SIDA VI REGION, 1987-2006

Departamento de Epidemiología  
Diciembre 2007



# EVOLUCION DEL VIH-SIDA

## REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. B. O'HIGGINS 1987-2006.

Los primeros casos de VIH-SIDA se presentaron en 1989, cinco años después de los primeros casos en el país (1984). Entre 1990 y 2005 han muerto 155 personas a causa del SIDA y, hasta el 2006, se han notificado 355 persona por VIH o SIDA.


En este informe se presenta:

- La situación de la mortalidad por SIDA desde 1990 a 2005 (último año disponible), información proveniente de los certificados de defunción de ese período.
- Se analiza la incidencia, medida a través de las notificaciones realizadas por la VI Región entre 1987 y 2006, aunque las primeras notificaciones en esta región corresponden al año 1989 en adelante.

### I. MORTALIDAD POR SIDA

Entre 1990 y 2005 se produjeron en la región 155 defunciones por SIDA<sup>1</sup>, correspondiendo el 90% de ellas a hombres.

La mortalidad por SIDA en esta Región ha estado permanentemente por debajo del promedio nacional y muestra un comportamiento similar.



#### MORTALIDAD POR SIDA SEGÚN SEXO Y RAZÓN H:M REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1990-2005

Fuente DEIS, MINSAL 2007


| Año  | AMBOS SEXOS |       | HOMBRES |       | MUJERES |       | Razón H:M |
|------|-------------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------|
|      | Nº DEF.     | TASA* | Nº DEF. | TASA* | Nº DEF. | TASA* |           |
| 1990 | 1           | 0,1   | 1       | 0,3   | 0       | 0,0   | 0         |
| 1991 | 1           | 0,1   | 1       | 0,3   | 0       | 0,0   | 0         |
| 1992 | 0           | 0,0   | 0       | 0,0   | 0       | 0,0   | 0         |
| 1993 | 2           | 0,3   | 2       | 0,5   | 0       | 0,0   | 0         |
| 1994 | 4           | 0,5   | 4       | 1,1   | 0       | 0,0   | 0         |
| 1995 | 3           | 0,4   | 3       | 0,8   | 0       | 0,0   | 0         |
| 1996 | 7           | 0,9   | 6       | 1,6   | 1       | 0,3   | 6         |
| 1997 | 5           | 0,7   | 5       | 1,3   | 0       | 0,0   | 0         |
| 1998 | 11          | 1,4   | 10      | 2,5   | 1       | 0,3   | 10        |
| 1999 | 17          | 2,2   | 16      | 4,0   | 1       | 0,3   | 16        |
| 2000 | 13          | 1,6   | 11      | 2,7   | 2       | 0,5   | 6         |
| 2001 | 21          | 2,6   | 20      | 4,9   | 1       | 0,3   | 20        |
| 2002 | 21          | 2,6   | 19      | 4,6   | 2       | 0,5   | 10        |
| 2003 | 19          | 2,3   | 16      | 3,9   | 3       | 0,7   | 5         |
| 2004 | 16          | 1,9   | 14      | 3,3   | 2       | 0,5   | 7         |
| 2005 | 14          | 1,7   | 11      | 2,6   | 3       | 0,7   | 4         |

<sup>1</sup> CIE-9 (hasta 1996) : 279.5, 279.6, 279.7; CIE-10 (desde 1997) : B20-B24

\* Tasa por cien mil habitantes

<sup>1</sup> Considerando como tales los Códigos CIE-9 (hasta 1996): 279.5, 279.6 y 279.7 y CIE-10 (desde 1997) : B20-B24

En el año 2005 la mortalidad más alta se observa entre los varones de 30 a 39 años; en los menores de 20 años no se registran fallecidos en el año analizado.




## II. NOTIFICACIONES POR VIH Y SIDA


Entre 1987 (año de primer caso) y 2006 se han notificado 355 personas con VIH o SIDA. El 63% de ellos están notificados como VIH y los restantes 296 como SIDA. Para el análisis de la evolución de la edad, y con el fin de estabilizar los datos, se agruparon los casos en 4 quinquenios: 1987-1991, 1992-1996, 1997-2001, 2002-2006.

### 1. Tendencia 1987-2006

**SIDA:** La tasa de notificación ha presentado un discreto y muy lento aumento en el período analizado, manteniéndose prácticamente estable y por debajo de la tasa nacional.



**VIH:** Se observa un aumento también lento, pero con una pendiente algo mayor que en el caso de SIDA. La tasa también es inferior a la nacional.



**Notificaciones por VIH y SIDA  
Región del L B O'Higgins, 1987-2006**


La Región del Libertador B. O'Higgins ocupa el noveno lugar del país en la tasa de notificación por VIH de 26 casos por cien mil hab. y el décimo primero en SIDA con 13 casos por cien mil hab.

| Año  | VIH |       | SIDA |       |
|------|-----|-------|------|-------|
|      | Nº  | Tasa* | Nº   | Tasa* |
| 1989 | 3   | 0,5   | 2    | 0,3   |
| 1990 | 0   | 0,0   | 0    | 0,0   |
| 1991 | 2   | 0,3   | 1    | 0,1   |
| 1992 | 5   | 0,7   | 3    | 0,4   |
| 1993 | 2   | 0,3   | 4    | 0,5   |
| 1994 | 4   | 0,5   | 4    | 0,5   |
| 1995 | 7   | 0,9   | 4    | 0,5   |
| 1996 | 7   | 0,9   | 7    | 0,9   |
| 1997 | 11  | 1,4   | 12   | 1,6   |
| 1998 | 9   | 1,2   | 7    | 0,9   |
| 1999 | 7   | 0,9   | 7    | 0,9   |
| 2000 | 17  | 2,1   | 4    | 0,5   |
| 2001 | 20  | 2,5   | 7    | 0,9   |
| 2002 | 17  | 2,1   | 15   | 1,8   |
| 2003 | 21  | 2,6   | 13   | 1,6   |
| 2004 | 31  | 3,7   | 13   | 1,6   |
| 2005 | 33  | 3,9   | 15   | 1,8   |
| 2006 | 26  | 3,1   | 13   | 1,5   |


## 2. Distribución geográfica

Las regiones de Tarapacá, Metropolitana y de Valparaíso muestran las tasas acumuladas más altas en el período, tanto en VIH como en SIDA. La región con la tasa más baja de todo el país, para el SIDA, es Aysén. Mientras que la región con la tasa más baja de VIH es Araucanía.

Tasa acumulada de notificación de SIDA según región, Chile 1987-2006



Tasa acumulada de notificación de VIH según región, Chile 1987-2006





### 3. Distribución de personas con VIH-SIDA por sexo.

El análisis de las notificaciones de casos acumulados en el período 1987-2006, muestra que en todos los quinquenios el número de casos notificados de hombres supera al de mujeres, tanto en SIDA como en VIH. El 80% de los casos notificados en la región son hombres, porcentaje algo inferior al del país (85%). Sin embargo, en los dos últimos quinquenios la proporción de notificaciones por VIH en mujeres ha aumentado en un 164%.

En SIDA la razón hombre:mujer, en el período es 8

En VIH la razón hombre:mujer, en el período es 3



**Casos de SIDA según sexo, y razón hombre:mujer  
VI Región, 1987-2006**

| Etapa | Sexo               | Quinquenio |           |           |           | Total |
|-------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|       |                    | 1987-1991  | 1992-1996 | 1997-2001 | 2002-2006 |       |
| SIDA  | Hombre             | 3          | 19        | 33        | 61        | 116   |
|       | Mujer              | 0          | 3         | 4         | 8         | 15    |
|       | Total              | 3          | 22        | 37        | 69        | 131   |
|       | Razón hombre:mujer | 0          | 6         | 8         | 8         | 8     |
| VIH   | Hombre             | 4          | 21        | 50        | 91        | 166   |
|       | Mujer              | 1          | 4         | 14        | 37        | 56    |
|       | Total              | 5          | 25        | 64        | 128       | 222   |
|       | Razón hombre:mujer | 4          | 5         | 4         | 2         | 3     |

(\*) entre primer y último quinquenio  
1 caso sin etapa en último quinquenio


#### 4. Distribución de personas con VIH-SIDA por edad.

La distribución por edad muestra algunas diferencias entre los casos notificados como SIDA y como VIH.

**SIDA:** Las tasas más altas están entre los 20 y 49 años.

**VIH:** Las mayores tasas se dan entre los 20 y 49 años, marcadamente superior a resto de los grupos de edad y a las tasas de SIDA.

Tasa acumulada de notificaciones por SIDA y VIH por edad  
VI Región, 1987-2006



Tasa acumulada de notificación por VIH y SIDA según grupos de edad y sexo.

VI Región, 1987-2006

| Edad     | VIH     |       |         |       |       |       | SIDA    |       |         |       |       |       |
|----------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|
|          | Hombres |       | Mujeres |       | Total |       | Hombres |       | Mujeres |       | Total |       |
|          | Nº      | Tasa* | Nº      | Tasa* | Nº    | Tasa* | Nº      | Tasa* | Nº      | Tasa* | Nº    | Tasa* |
| 0-9      | 0       | 0,0   | 1       | 1,3   | 1     | 0,6   | 3       | 3,8   | 1       | 1,3   | 4     | 2,6   |
| 10-19    | 7       | 9,8   | 4       | 5,9   | 11    | 7,9   | 2       | 2,8   | 0       | 0,0   | 2     | 1,4   |
| 20-29    | 61      | 97,7  | 30      | 50,0  | 91    | 74,3  | 32      | 51,2  | 6       | 10,0  | 38    | 31,0  |
| 30-39    | 70      | 108,5 | 11      | 17,5  | 81    | 63,6  | 39      | 60,5  | 2       | 3,2   | 41    | 32,2  |
| 40-49    | 21      | 44,7  | 7       | 15,6  | 28    | 30,5  | 23      | 49,0  | 5       | 11,1  | 28    | 30,5  |
| 50-59    | 3       | 9,6   | 2       | 6,6   | 5     | 8,1   | 11      | 35,3  | 1       | 3,3   | 12    | 19,5  |
| 60-69    | 3       | 15,0  | 0       | 0,0   | 3     | 7,3   | 5       | 25,0  | 0       | 0,0   | 5     | 12,2  |
| 70 y más | 1       | 6,9   | 1       | 5,5   | 2     | 6,1   | 1       | 6,9   | 0       | 0,0   | 1     | 3,0   |
| Total    | 166     | 42,6  | 56      | 14,7  | 222   | 28,8  | 116     | 29,8  | 15      | 3,9   | 131   | 17,0  |

\* Tasa por cien mil habitantes

1 caso sin etapa

Tasa de notificaciones por grupos de edad y Quinquenio.

VI Región, 1987-2006


| Edad     | 1987-1991 |       | 1992-1996 |       | 1997-2001 |       | 2002-2006 |       | Total |       |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|          | Nº        | tasa* | Nº        | tasa* | Nº        | tasa* | Nº        | tasa* | Nº    | tasa* |
| 0-9      | 0         | 0     | 0         | 0     | 0         | 0,0   | 5         | 3,6   | 5     | 3,2   |
| 10-19    | 1         | 0,8   | 1         | 0,7   | 5         | 3,5   | 6         | 3,9   | 13    | 9,4   |
| 20-29    | 4         | 3,2   | 24        | 18,9  | 33        | 27,8  | 68        | 59,3  | 129   | 103,8 |
| 30-39    | 2         | 2,0   | 8         | 6,6   | 36        | 27,6  | 76        | 58,1  | 122   | 96,9  |
| 40-49    | 1         | 1,5   | 12        | 14,7  | 14        | 14,1  | 29        | 23,9  | 56    | 63,6  |
| 50-59    | 0         | 0,0   | 2         | 3,6   | 7         | 10,6  | 9         | 11,3  | 18    | 30,4  |
| 60-69    | 0         | 0,0   | 0         | 0,0   | 3         | 7,0   | 5         | 9,8   | 8     | 20,0  |
| 70 y más | 0         | 0,0   | 0         | 0,0   | 3         | 8,5   | 0         | 0,0   | 3     | 9,5   |
| Total    | 8         | 1,2   | 47        | 6,3   | 101       | 12,8  | 198       | 23,8  | 354   | 46,4  |

(\*) por cien mil habitantes entre primer y último quinquenio


## 5. Distribución de personas con VIH-SIDA por nivel de escolaridad.

En la distribución de los casos de VIH-SIDA según nivel de escolaridad se aprecia que el porcentaje de personas con educación media y superior los porcentajes son similares. En los casos de SIDA se registra un 21% de personas sin registro de esta variable.


Casos de SIDA según nivel de escolaridad, VI región 1987-2006



Casos de VIH según nivel de escolaridad, VI región 1987-2006



Distribución porcentual según escolaridad de la población general. Chile 2002 (censo)



Casos de VIH y SIDA según nivel de escolaridad y quinquenio.

VI Región 1987-2006

| Etapa | Escolaridad | 1987-1991 |       | 1992-1996 |       | 1997-2001 |       | 2002-2006 |       | Total |       |
|-------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|       |             | Nº        | %     | Nº        | %     | Nº        | %     | Nº        | %     | Nº    | %     |
| SIDA  | Básica      | 3         | 100,0 | 7         | 31,8  | 10        | 27,0  | 12        | 17,4  | 32    | 24,4  |
|       | Media       | 0         | 0,0   | 8         | 36,4  | 15        | 40,5  | 24        | 34,8  | 47    | 35,9  |
|       | Superior    | 0         | 0,0   | 5         | 22,7  | 4         | 10,8  | 11        | 15,9  | 20    | 15,3  |
|       | Ninguna     | 0         | 0,0   | 0         | 0,0   | 1         | 2,7   | 4         | 5,8   | 5     | 3,8   |
|       | Desconocido | 0         | 0,0   | 2         | 9,1   | 7         | 18,9  | 18        | 26,1  | 27    | 20,6  |
|       | Total       | 3         | 100,0 | 22        | 100,0 | 37        | 100,0 | 69        | 100,0 | 131   | 100,0 |
| VIH   | Básica      | 3         | 60,0  | 12        | 48,0  | 18        | 28,1  | 46        | 35,9  | 79    | 35,6  |
|       | Media       | 1         | 20,0  | 11        | 44,0  | 28        | 43,8  | 46        | 35,9  | 86    | 38,7  |
|       | Superior    | 0         | 0,0   | 0         | 0,0   | 13        | 20,3  | 28        | 21,9  | 41    | 18,5  |
|       | Ninguna     | 0         | 0,0   | 1         | 4,0   | 4         | 6,3   | 1         | 0,8   | 6     | 2,7   |
|       | Desconocido | 1         | 20,0  | 1         | 4,0   | 1         | 1,6   | 7         | 5,5   | 10    | 4,5   |
|       | Total       | 5         | 100,0 | 25        | 100,0 | 64        | 100,0 | 128       | 100,0 | 222   | 100,0 |

1 casos sin etapa

**Casos de VIH/SIDA según nivel de escolaridad, quinquenio y sexo.**

**VI Región 1987-2006**


| Sexo    | Escolaridad | 1987-1991 |       | 1992-1996 |       | 1997-2001 |       | 2002-2006 |       | Total |       |
|---------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|         |             | Nº        | %     | Nº        | %     | Nº        | %     | Nº        | %     | Nº    | %     |
| Mujeres | Básica      | 0         | 0,0   | 2         | 28,6  | 7         | 38,9  | 22        | 48,9  | 31    | 43,7  |
|         | Media       | 0         | 0,0   | 3         | 42,9  | 8         | 44,4  | 14        | 31,1  | 25    | 35,2  |
|         | Superior    | 0         | 0,0   | 0         | 0,0   | 1         | 5,6   | 3         | 6,7   | 4     | 5,6   |
|         | Ninguna     | 0         | 0,0   | 0         | 0,0   | 0         | 0,0   | 2         | 4,4   | 2     | 2,8   |
|         | Desconocido | 1         | 100,0 | 2         | 28,6  | 2         | 11,1  | 4         | 8,9   | 9     | 12,7  |
|         | Total       | 1         | 100,0 | 7         | 100,0 | 18        | 100,0 | 45        | 100,0 | 71    | 100,0 |
| Hombres | Básica      | 6         | 85,7  | 17        | 42,5  | 21        | 25,3  | 36        | 23,5  | 80    | 28,3  |
|         | Media       | 1         | 14,3  | 16        | 40,0  | 35        | 42,2  | 56        | 36,6  | 108   | 38,2  |
|         | Superior    | 0         | 0,0   | 5         | 12,5  | 16        | 19,3  | 36        | 23,5  | 57    | 20,1  |
|         | Ninguna     | 0         | 0,0   | 1         | 2,5   | 5         | 6,0   | 3         | 2,0   | 9     | 3,2   |
|         | Desconocido | 0         | 0,0   | 1         | 2,5   | 6         | 7,2   | 22        | 14,4  | 29    | 10,2  |
|         | Total       | 7         | 100,0 | 40        | 100,0 | 83        | 100,0 | 153       | 100,0 | 283   | 100,0 |

1 casos sin etapa

**6. Distribución de personas con VIH-SIDA por vía de exposición al virus.**

En la Región del L. B. O'Higgins la principal vía de exposición es la sexual (86%), siendo las vías homosexual y heterosexual las más declaradas. La vía bisexual ha experimentado un ascenso en el último quinquenio. En alrededor de un 11% de las personas declara desconocer la vía de exposición.

**Distribución porcentual de casos de VIH-SIDA por vía de exposición VI Región, 1987-2006**



**SIDA:** Entre el segundo y cuarto quinquenio, la vía de exposición homosexual muestra un descenso; mientras que la vía heterosexual registra incrementos especialmente en los dos últimos quinquenios. La vía de transmisión vertical aumento en el quinquenio 2002-2006.

**VIH:** Al igual que en SIDA se observa un descenso en el último quinquenio de las personas que declaran la vía homosexual. La vía de transmisión heterosexual registra los mayores incrementos de un 127% entre el tercer y último quinquenio.

**Casos de VIH y SIDA según factor de exposición según etapa y quinquenio.**


**VI Región 1987-2006**

| Etapa | Factor de exposición | 1987-1991 |       | 1992-1996 |       | 1997-2001 |       | 2002-2006 |       | Total |       |
|-------|----------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|       |                      | Nº        | %     | Nº        | %     | Nº        | %     | Nº        | %     | Nº    | %     |
| SIDA  | Homosexual           | 1         | 33,3  | 9         | 40,9  | 10        | 27,0  | 14        | 20,3  | 34    | 26,0  |
|       | Bisexual             | 1         | 33,3  | 3         | 13,6  | 2         | 5,4   | 6         | 8,7   | 12    | 9,2   |
|       | Heterosexual         | 1         | 33,3  | 2         | 9,1   | 21        | 56,8  | 28        | 40,6  | 52    | 39,7  |
|       | Usuario Drogas       | 0         | 0,0   | 0         | 0,0   | 0         | 0,0   | 0         | 0,0   | 0     | 0,0   |
|       | Transfusional        | 0         | 0,0   | 0         | 0,0   | 0         | 0,0   | 0         | 0,0   | 0     | 0,0   |
|       | Vertical             | 0         | 0,0   | 0         | 0,0   | 0         | 0,0   | 4         | 5,8   | 4     | 3,1   |
|       | Desconocido          | 0         | 0,0   | 8         | 36,4  | 4         | 10,8  | 17        | 24,6  | 29    | 22,1  |
|       | Total                | 3         | 100,0 | 22        | 100,0 | 37        | 100,0 | 69        | 100,0 | 131   | 100,0 |
| VIH   | Homosexual           | 2         | 40,0  | 12        | 42,9  | 29        | 44,6  | 38        | 29,9  | 81    | 36,0  |
|       | Bisexual             | 2         | 40,0  | 1         | 3,6   | 5         | 7,7   | 15        | 11,8  | 23    | 10,2  |
|       | Heterosexual         | 0         | 0,0   | 10        | 35,7  | 29        | 44,6  | 66        | 52,0  | 105   | 46,7  |
|       | Usuario Drogas       | 0         | 0,0   | 1         | 3,6   | 0         | 0,0   | 1         | 0,8   | 2     | 0,9   |
|       | Transfusional        | 0         | 0,0   | 2         | 7,1   | 1         | 1,5   | 1         | 0,8   | 4     | 1,8   |
|       | Hemofílico           | 0         | 0,0   | 0         | 0,0   | 0         | 0,0   | 0         | 0,0   | 0     | 0,0   |
|       | Vertical             | 0         | 0,0   | 0         | 0,0   | 0         | 0,0   | 1         | 0,8   | 1     | 0,4   |
|       | Desconocido          | 1         | 20,0  | 2         | 7,1   | 1         | 1,5   | 5         | 3,9   | 9     | 4,0   |
|       | Total                | 5         | 100,0 | 28        | 100,0 | 65        | 100,0 | 127       | 100,0 | 225   | 100,0 |


**7. Distribución de personas con VIH-SIDA por etapa diagnóstica en la primera notificación.**

Del total de casos de VIH-SIDA notificados en la Región del L. Bdo O'Higgins entre 1987 y 2006, el 63% se notificó en etapa diagnóstica de VIH, mientras que el 37% fue notificado en etapa de SIDA.

Distribución de casos de VIH-SIDA en mujeres por etapa diagnóstica en la 1ª notificación, VI Región 1987-2006



Distribución de casos de VIH-SIDA en hombres por etapa diagnóstica en la 1ª notificación, VI Región 1987-2006



El porcentaje de mujeres que es notificada en etapa VIH es superior a los hombres, en todos los quinquenios. Esto se podría deber a que las mujeres tienen más acceso a la oferta de examen a través del control de salud sexual; control de embarazo; paternidad responsable, entre otros.

**Casos de VIH/SIDA según Diagnóstico de ingreso, sexo y quinquenio.**

**VI Región 1987-2006**

| Sexo    | Diagnóstico Ingreso | 1987-1991 |       | 1992-1996 |       | 1997-2001 |       | 2002-2006 |       | Total |       |
|---------|---------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|         |                     | Nº        | %     | Nº        | %     | Nº        | %     | Nº        | %     | Nº    | %     |
| Mujeres | VIH                 | 1         | 100   | 4         | 57,1  | 14        | 77,8  | 37        | 82,2  | 56    | 78,9  |
|         | SIDA                | 0         | 0     | 3         | 42,9  | 4         | 22,2  | 8         | 17,8  | 15    | 21,1  |
|         | Total               | 1         | 100   | 7         | 100,0 | 18        | 100,0 | 45        | 100,0 | 71    | 100,0 |
| Hombres | VIH                 | 4         | 57,1  | 21        | 52,5  | 50        | 60,2  | 91        | 59,9  | 166   | 58,9  |
|         | SIDA                | 3         | 42,9  | 19        | 47,5  | 33        | 39,8  | 61        | 40,1  | 116   | 41,1  |
|         | Total               | 7         | 100,0 | 40        | 100,0 | 83        | 100,0 | 152       | 100,0 | 282   | 100,0 |

**SÍNTESIS:**

- Entre 1990 y 2005 se produjeron en la región 155 defunciones por SIDA, correspondiendo el 90% de ellas a hombres.
- En el año 2005 la mortalidad más alta se observa entre los varones de 30 a 39 años.
- El 63% de los casos se notificaron como VIH y los restantes 296 como SIDA.
- El 80% de los casos notificados en la región son hombres, porcentaje algo inferior al del país (85%).
- El porcentaje de mujeres que es notificada en etapa VIH es superior a los hombres, en todos los quinquenios. Esto se podría deber a que las mujeres tienen más acceso a la oferta de examen a través del control de salud sexual; control de embarazo; paternidad responsable, entre otros.
- La principal vía de exposición es la sexual (86%), siendo las vías homosexual y heterosexual las más declaradas. La vía bisexual ha experimentado un ascenso en el último quinquenio.
- En alrededor de un 11% de las personas notificadas declara desconocer la vía de exposición.