


Servicio de Salud	Causa de las Intoxicaciones					Total Casos Enero - Junio 2002	Mediana Enero - Junio 1998-2001	Tasa Incidencia Acumulada 2002	Total Fallecidos 2002(*)
	No intencional		Intencional						
	Laboral	Accidental	Voluntario	Provocado	No espec.				
Arica	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	0,5	S/I	S/I
Iquique	0	5	0	0	0	5	0,5	2,4	0
Atacama	11	0	4	0	0	15	0,0	5,3	1
Coquimbo	2	40	1	0	0	43	0,0	7,2	0
Valparaíso-San Antonio	11	0	0	0	0	11	2,0	2,4	0
Viña del Mar-Quillota	12	1	0	0	0	13	10,0	1,4	0
Aconcagua	4	2	4	0	0	10	15,5	4,3	0
M.Norte	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	0,0	S/I	S/I
M.Occidente	33	21	4	0	0	58	31,5	5,3	0
M.Central	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
M. Sur	8	0	1	0	0	9	7,5	0,8	1
M. Sur Oriente	0	2	0	0	0	2	1,0	0,1	0
O'Higgins	16	3	8	0	0	27	20,0	3,3	3
Maule	90	1	3	0	0	94	30,0	10,1	1
Ñuble	2	7	7	0	0	16	21,0	3,5	1
Concepción	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
Arauco	0	0	1	0	0	1	S/I	1,0	0
Bío Bío	2	9	9	0	0	20	4,0	5,1	2
Araucanía Norte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0
Araucanía Sur	0	0	0	0	0	0	1,0	0,0	0
Osorno	0	0	0	0	0	0	1,5	0,0	0
Valdivia	2	2	1	0	0	5	0,0	2,3	0
Llanquihue	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	0,0	S/I	S/I
Total	193	93	43	0	0	329	182	3,2	9

Fuente: Notificaciones SNSS recepcionadas en REVEP MINSAL, al 17 de julio 2002.
 (*) Enero a Junio 2002
 S/I= Sin información

Tabla 12
 Distribución de Intoxicaciones
 Agudas por Plaguicidas
 según Servicio de Salud
 y Causa de Intoxicación.
 REVEP. Chile 2002.

Tasa Incidencia Acumulada

□ No pertenece a REVEP ■ 0,1 - 3,0 ▨ 3,1 - 6,0 ▩ 6,1 - 10,1



Ingrediente activo del Plaguicida	Nº Casos	%	Nº casos en Brote
1 Azinfosmetil	76	23,1	76
2 Metamidofos	63	19,1	50
3 Azufre	15	4,6	5
4 Clorpirifos	14	4,3	8
5 Metomilo	11	3,3	2
6 Cipermetrina	8	2,4	7
7 Diclorvos	8	2,4	8
8 Glifosato	8	2,4	0
9 Dimetoato	8	2,4	5
10 Tetrametrina	7	2,1	0
11 Brodifacoum	6	1,8	0
Descon-sin/inform	43	13,1	5
Otros	62	18,8	11
Total casos	329	100	177

Listado de ingredientes activos en Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas. REVEP, Chile Enero-Junio 2002.

Fuente: Notificaciones SNSS recepcionadas en REVEP MINSAL, al 17 Julio 2002.

Comentario

Durante el primer semestre del año 2002 fueron notificados por REVEP un total de 329 casos de intoxicación aguda por plaguicidas. El 53% correspondió a casos involucrados en brotes.

Las características de las intoxicaciones fueron las siguientes:

- El 50% de los intoxicados requirió hospitalización. La letalidad de los casos fue de 3%. De los 9 casos fatales, 7 tuvieron origen voluntario y 2 fueron accidentales no laborales en menores de 1 y 4 años de edad.
- El 59% de las intoxicaciones fueron laborales, seguido por accidentales no laborales con un 28%. Hubo un 13% (43) de casos voluntarios, con una letalidad de un 16%.
- El 50% de los casos se presentó en mujeres, al igual que en el año 2001. El promedio edad de los casos fue de 29 años. Los

menores de 15 años correspondieron al 25% (59), de los cuales, el grupo de 0 a 5 años concentró el 32% de las intoxicaciones.

- Los plaguicidas organofosforados, como en los años anteriores, continúan siendo la primera causa de las intoxicaciones, con un 58%. Cabe destacar que en el 13% de los casos no se ha logrado obtener información sobre el tipo de plaguicida. Respecto a la toxicidad de estos productos, fue Altamente Tóxico (Tipo2, FAO) en un 51% de los casos, seguido por Moderadamente Tóxicos (Tipo3, FAO) en un 19%.
- Los insecticidas correspondieron a un 69% de los casos. Cabe destacar que se notificaron 9 casos por Rodenticidas.