ANEXO 2
SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA ERRADICACION DE LA POLIOMIELITIS
FICHA DE SEGUIMIENTO DE CASO

Recuerde que todo Caso Probable de Poliomielitis, que haya sido ingresado al sistema de Vigilancia, deberá tener una evaluación médica a los 60 días post inicio de la PFA, a fin de detectar secuelas compatibles con Polio.

Nombre del caso: _____

Fecha de inicio de la parálisis _____Fecha evaluación de los 60 días: _____

Evolución Clínica (Encierre en un circulo lo que corresponda)

Parálisis Residual compatible con Polio: SI__ NO__ Atrofia: SI__ NO__

Hipótesis Diagnóstica Inicial: _____

Diagnóstico Final: _____

Clasificación final

Recuerde las siguientes definiciones:

Caso Descartado: es todo caso probable que tiene resultado negativo para poliovirus salvaje en una muestra adecuada de heces, que a los 60 días está sin parálisis residual compatible con polio y la muestra ha resultado negativa para virus polio.
Cuando no se ha logrado obtener una muestra de heces, para descartar el caso será necesario documentarlo con otros estudios neurofisiológicos y el examen clínico realizado por el neurólogo tratante.

Caso Compatible: es todo caso probable que presenta parálisis residual compatible con poliomielitis después de 60 días de iniciada la PFA o al cual no se le hizo seguimiento o el que falleció sin que se le tomara una muestra de heces durante los primeros 14 días post inicio de la PFA.

Caso de Poliomielitis asociada a la vacuna: es el caso de PFA, cuyo origen se atribuye al virus de la vacuna y que cumple los 4 requisitos siguientes:
Clínicamente es típico de poliomielitis, incluyendo las secuelas; y había recibido VPO entre 4 y 40 días antes del inicio de la parálisis; y se le había aislado virus polio vacunal en la muestra de heces; y La dosis implicada debe ser, de preferencia, la primera.

De acuerdo a lo anterior este caso es:	DESCARTADO:	SI__ NO__
	COMPATIBLE:	SI__ NO__
	ASOCIADO A LA VACUNA:	SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Nombre del responsable de la Evaluación: _____