Ministerio de Salud

Gobierno de Chile

Boletín de Vigilancia

Eventos de Salud Pública
SE 09 de 2017

(26 de febrero al 4 de marzo)

Centro Nacional de Enlace
Departamento de Epidemiología
División de Planificación Sanitaria
Ministerio de Salud

Objetivo

Mantener un sistema de vigilancia basado en eventos de salud pública de interés nacional e internacional, que podrían llegar a tener un impacto en la salud de la población chilena.

Características

La información proveniente de fuentes formales es considerada como confiable y veraz. Cuando se trata de una fuente informal, la confiabilidad de la información no está establecida y/o se debe verificar.

Fuentes de Información

Fuentes de Información	Formales	Informales
	OMS	Comunidad
	OPS	Redes Sociales
	Ministerios Públicos	ONG
	Instituto de Salud Pública	Sector Privado
	SEREMI/ Servicios de Salud	Redes de Alerta
	Web de sitios oficiales	Medios de Comunicación

Tabla de Contenido

SE 09 de 2017

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional
- Hantavirus
- influenza
- Fragata Portuguesa

Eventos con potencial impacto para la salud pública
Noticias nacionales de salud pública

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (América)
- Contaminación Ambiental
- Fiebre Amarilla
- Influenza en Las Américas
- Chikungunya

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (Asia)
- Poliovirus Salvaje

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional sin actualización
- Virus Zika en Las Américas
- Sarampión/Rubeola en Las Américas
- MERS-CoV

Noticias internacionales de salud pública

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional

Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)

SE 09 de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, a la SE 09 (07 de marzo de 2017):

Se han confirmado 34 casos de SCPH en el país, con 6 fallecidos (17,6% letalidad): 2 en Los Ríos, 2 en Araucanía, 1 en Biobío, y 1 en Los Lagos.

- 24 personas de sexo masculino (70,6%) y 10 del sexo femenino.
- A igual SE, en el año 2016 hubo 18 casos, con 4 fallecidos (22,2% letalidad). La mediana de los últimos 5 años corresponde a 19 casos (menor a lo observado en el año 2017), con 6 fallecidos (igual a lo observado en el año 2017).
- La mediana de edad es de 41 años, con un rango entre 3 – 83 años.
- Los casos, según probable lugar de infección, se han presentado en: 8 en Biobío, 8 en Los Ríos, 4 en Araucanía, 4 en Los Lagos, 3 en Maule, 1 en Aysén, 1 en O'Higgins, 1 en Valparaíso y 4 aún en estudio.
- 10 trabajadores agrícolas, 9 estudiantes, 3 trabajadores forestales, 2 dueña de casa, y 10 con otras actividades.
-

Casos de SCPH, por comuna de infección. Chile, Enero 2017 a la fecha.



Casos SCPH, por comuna de infección.

Región	Comuna	2017
Valparaíso	Zapallar	1
	Subtotal	*1*
O´higgins	NAVIDAD	1
	Subtotal	*1*
Maule	LINARES	1
	LONGAVÍ	1
	MOLINA	1
	Subtotal	*3*
Biobío	ARAUCO	1
	LOS ANGELES	1
	PINTO	1
	SAN CARLOS	2
	SANTA BÁRBARA	1
	TOMÉ	1
	YUNGAY	1
	Subtotal	*8*
Araucanía	GORBEA	1
	TEODORO SCHMIDT	1
	VICTORIA	2
	Subtotal	*4*
Los Ríos	CORRAL	1
	LAGO RANCO	1
	LOS LAGOS	2
	VALDIVIA	3
	Subtotal	*7*
Los Lagos	FUTALEUFU	1
	LOS MUERMOS	1
	PURRANQUE	1
	RIO NEGRO	1
	Subtotal	*4*
Aisén	AISÉN	1
	Subtotal	*1*
*** TOTAL al 07 de MARZO 2017**		**29**

* No se incluye otros **5** casos en el mapa, por ser indeterminado el lugar de infección.

Influenza en Chile

SE 08 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

La notificación de ETI en la semana 8 aumenta respecto a la semana previa, sin embargo se mantiene dentro del promedio de la curva epidémica. Se registran casos de influenza A en el centinela de Iquique y en Coquimbo.

Las atenciones por ETI en las urgencias hospitalarias bajan levemente y la neumonía se mantiene respecto a la semana previa.

Se registra baja positividad a virus respiratorios en la vigilancia de IRAG en las primeras semanas del año. En la semana 7 se detecta un aumento de casos IRAG asociada a influenza A(H3N2) en Iquique.

Se requiere mantener activo todos los componentes de la Vigilancia de influenza para la detección y manejo de los casos según las guías clínica y de vigilancia de Influenza. En especial la notificación y toma de muestras en los centros centinela de ETI e IRAG.

Notificación de Enfermedad Tipo Influenza en Atención Primaria. Umbral de Alerta (&)
Chile, SE 8, 2017 (comparado con 2012-2016)



Fuente: Vigilancia Centinela de ETI. Dpto. Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.
& En base a método de Curva Epidémica y Umbrales de Alerta, OPS/OMS

Tasa de Enfermedad Tipo Influenza en Atención Primaria
Chile, 2013-2017 (SE 8).



Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Dpto. Epidemiología, DIPLAS/MINSAL.

Fragata Portuguesa

07 de Marzo de 2017

Fuente: División de Políticas Públicas, DIPOL. Ministerio de Salud

A continuación se presenta el estado de las playas con prohibición de baño por presencia de fragata portuguesa, actualizado al martes 07 de Marzo a las 13:00 horas:

Región	Playa	Comuna
Araucanía	Playa de Boca Budi	Puerto Saavedra
Araucanía	Playa Maule	Puerto Saavedra
Araucanía	Playa Moncul	Carahue
Los Lagos	Playa de Arena Gruesa	Ancud

Eventos con potencial impacto para la Salud Pública

Últimos sismos registrados

06 de Marzo de 2017

Fuente: Sismología

Fecha Local	Lugar	Magnitud
2017/03/07 09:17:29	52 km al O de Socaire	4.2 Ml
2017/03/07 06:56:14	60 km al SO de Mina Collahuasi	3.1 Ml
2017/03/07 04:19:19	47 km al E de Pica	4.0 Ml
2017/03/07 03:01:08	86 km al SO de Alto Hospicio	3.0 Ml
2017/03/06 21:55:40	14 km al S de Canela Baja	3.1 Ml
2017/03/06 14:37:59	96 km al E de Socaire	4.8 Mw
2017/03/06 14:15:08	20 km al S de La Serena	3.6 Ml
2017/03/06 12:47:27	25 km al SO de Santiago	3.4 Ml
2017/03/06 10:57:29	31 km al SO de Salamanca	3.4 Ml
2017/03/06 05:34:27	21 km al E de Sierra Gorda.	3.7 Ml
2017/03/06 04:10:41	77 km al SE de Socaire	3.7 Ml
2017/03/06 03:49:31	**14 km al SO de Ovalle**	**3.4 Ml**
2017/03/06 03:43:17	95 km al O de Cobquecura	3.3 Ml
2017/03/06 02:26:16	152 km al SO de Puerto Natales	3.8 Ml
2017/03/05 23:56:22	**46 km al SE de Futrono**	**4.2 Ml**

Últimos sismos registrados

06 de Marzo de 2017

Fuente: Biobiochile.cl; 24horas.cl

Sismo de ligera intensidad se percibe en región de Los Ríos



Sismo se percibe en el norte del país

06
MARZO
2017

POR 24HORAS.CL TVN

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.8 Richter al Este de Socaire.

Twittear Compartir 1 Compartir 0



Monitoreo de actividad volcánica

06 de Marzo de 2017

Fuente: Sernageomín

ZONA NORTE

Guallatiri	
Irruputuncu	
Láscar	
Olca	
Parinacota	
San Pedro y San Pablo	
VER MAS	
Taapaca	
Isluga	
Ollagüe	
Lastarria	

ZONA CENTRO

Planchón - Peteroa	
Descabezado Grande y	
Tinguiririca	
San José	
Tatara - San Pedro	
Nevado de Longaví	
VER MAS	
Laguna del Maule	
Tupungatito	

ZONA SUR

Lanín	
Nevados de Chillán	
Copahue	
Antuco	
Calbuco	
Callaqui	
VER MAS	
Chaitén	
Corcovado y Yanteles	
Hudson	
Villarrica	
Llaima	
Lonquimay y Tolhuaca	
Mocho - Choshuenco	
Osorno	
Puyehue - Cordón Ca	
Quetrupillán	
Sollipulli	
Antillanca - Casabla	
Carrán-Los Venados	
Yate y Hornopirén	
Michinmahuida	
Melimoyu	
Macá y Cay	
Mentolat	
Huequi	

Radiación Ultravioleta

06 de Marzo de 2017

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

REGIÓN	RADIACIÓN UV
Arica y Parinacota	
Tarapacá	
Antofagasta	
Atacama	
Coquimbo	
Valparaíso	
Metropolitana	
O´Higgins	
Maule	

REGIÓN	RADIACIÓN UV
Biobío	
Araucanía	
Los Ríos	
Los Lagos	
Aysén	
Magallanes y Antártica	
Isla de Pascua	
Juan Fernández	
Antártica	

Nota: Este pronóstico tiene validez de tres días (a partir del 02 de septiembre) y solo aplica para una condición de día despejado

Alertas ONEMI

06 de Marzo de 2017

Fuente: ONEMI

07/03/2017 | 00:54 | Valparaíso

Monitoreo Alerta Amarilla para la comuna de Cartagena por incendio forestal

06/03/2017 | 23:55 | Maule

Monitoreo Alerta Amarilla para las comunas de Molina, Curicó, Romeral y Teno por actividad del complejo volcánico Planchón-Peteroa

06/03/2017 | 21:47 | Valparaíso, Lib. Gral Bernardo O'Higgins

Resumen nacional de incendios forestales

06/03/2017 | 20:37 | Lib. Gral Bernardo O'Higgins

Se declara Alerta Amarilla para la comuna de Navidad por incendio forestal

06/03/2017 | 20:27 | Araucanía, Los Ríos

Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para comunas de las regiones de La Araucanía y Los Ríos por actividad del volcán Villarrica

06/03/2017 | 20:08 | Coquimbo

Se declara Alerta Amarilla para la comuna de Ovalle por incendio forestal

06/03/2017 | 20:00 | Araucanía

Monitoreo Alerta Amarilla para la comuna de Curarrehue por actividad del Volcán Lanín

06/03/2017 | 19:38 | Biobío

Monitoreo Alerta Amarilla para las comunas de Pinto y Coihueco por actividad del complejo volcánico Nevados de Chillán

Incendios Forestales

06 de Marzo de 2017

Fuente: Ahoranoticias.cl

Noticias Nacionales

Noticias nacionales

06 de Marzo de 2017

Fuente: Biobiochile.cl; Latercera.com; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl

Los Lagos

Clausuran hogar de menores por intoxicación con gases emanados desde ducto con fecas

Biobío

En Concepción lanzan plan piloto de plasma para tratar hantavirus

Autor: Karin Hillmann / Concepción

El programa comenzará a ser implementado en el Centro de Sangre de la Región del Biobío. Suero busca reforzar el sistema inmunológico de personas infectadas y reducir la mortalidad.

Región Metropolitana

Investigan intoxicación por consumo de jurel en Chiloé y Calbuco

Enero registró el mayor aumento en casos de virus Hanta: no descartan que cifras sigan al alza

Noticias nacionales

06 de Marzo de 2017

Fuente: Elmercurio.cl; 24horas.cl

Región Metropolitana

FALSIFICADO Y ADULTERADO:

ISP emite alerta por medicamento ingresado a Chile

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió ayer una alerta por la presencia de Viadil Compuesto, que es un antiespasmódico y analgésico. Este año, en Arica, Aduanas ha detectado más de mil unidades ingresadas desde Perú. Análisis revelaron que no contenían principios activos declarados en su fórmula ni información de su vencimiento.

O´Higgins

Onemi confirma derrame de "material peligroso" en río Cachapoal

06 MARZO 2017

POR 24HORAS.CL TVN

Se investiga la caída de hidrocarburos en la zona, descartando de momento un posible corte de agua en Rancagua y Machalí.

Twittear | Compartir 0 | Compartir 100

IMAGEN

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional

- América

Contaminación Ambiental

06 de Marzo de 2017

Fuente: OPS

Las consecuencias de la contaminación ambiental: 1,7 millones de defunciones infantiles anuales, según la OMS

De acuerdo con dos nuevos informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de una cuarta parte de las defunciones de niños menores de cinco años, son consecuencia de la contaminación ambiental. Cada año, las condiciones insalubres del entorno, tales como la contaminación del aire en espacios cerrados y en el exterior, la exposición al humo de tabaco ajeno, la insalubridad del agua, la falta de saneamiento y la higiene inadecuada, causan la muerte de 1,7 millones de niños menores de cinco años.

En el primer informe, titulado La herencia de un mundo sostenible: Atlas sobre Salud Infantil y Medio Ambiente, se indica que una gran parte de las enfermedades que se encuentran entre las principales causas de muerte de los niños de un mes a 5 años, como las enfermedades diarreicas, el paludismo y las neumonías, pueden prevenirse mediante intervenciones que reducen los riesgos ambientales, tales como el acceso al agua potable y el uso de combustibles menos contaminantes para cocinar.

La Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS, señala que "la insalubridad del medio ambiente puede ser letal, especialmente para los niños pequeños, que son especialmente vulnerables a la contaminación del aire y el agua debido a que sus órganos y su sistema inmunitario se están desarrollando y a que todo su cuerpo, en especial sus vías respiratorias, es más pequeño".

La exposición a sustancias peligrosas en el embarazo aumenta el riesgo de prematuridad. Además, la contaminación del aire en espacios cerrados y en el exterior y la exposición al humo de tabaco ajeno, aumenta el riesgo que corren los bebés y niños en edad preescolar de contraer neumonías en su infancia y enfermedades respiratorias crónicas (por ejemplo, asma) durante toda la vida. La contaminación del aire también puede aumentar el riesgo de sufrir cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y cáncer a lo largo del ciclo de vida.

Fiebre Amarilla en Las Américas

SE 07 de 2017

Fuente: OPS

Desde la semana epidemiológica (SE) 1 y hasta la SE 7 de 2017, Brasil, Colombia, el Estado Plurinacional de Bolivia y Perú, han notificado casos sospechosos y confirmados de fiebre amarilla.

Brasil: Desde el inicio del brote, en diciembre de 2016, y hasta la SE 7 de 2017, se notificaron 1.368 casos de fiebre amarilla (326 confirmados, 125 descartados y 916 sospechosos que permanecen en investigación), incluidas 220 defunciones (109 confirmadas, 6 descartadas y 105 en investigación).

La tasa de letalidad entre los casos confirmados es de 33% y 11% entre los casos sospechosos.

De acuerdo al sitio probable de infección, el 83% de los casos sospechosos y confirmados se notificaron en Minas Gerais (1.029), seguido de Espírito Santo (185), São Paulo (10), Bahía (9), Tocantins (2), Rio Grande do Norte (1) y Goiás (1).

En tanto, los casos confirmados, se distribuyen en tres estados: Minas Gerais (269), Espírito Santo (53), y São Paulo (4).

Distribución geográfica de casos humanos y epizootias por fiebre amarilla. Brasil, hasta el 24 febrero de 2017



Fuente: Datos publicados por el Ministerio de Salud de Brasil (Monitoramento dos casos e óbitos de Febre Amarela no Brasil), compilados y reproducidos por la OPS/OMS

Influenza: OPS

SE 07 del año 2017

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza y de otros virus respiratorios continuó en aumento. En Canadá, la actividad de influenza aumentó, con predominio de influenza A(H3N2), y las consultas por ETI durante la SE 7 (1,73%) disminuyeron ligeramente en comparación con la semana previa. En los Estados Unidos, la positividad de VSR (16,1%) disminuyó ligeramente y la actividad de influenza (23,96%) continuó en aumento, con predominio de influenza A(H3N2). La actividad de ETI se ubicó sobre la línea de base nacional de 2,2%. En México, la actividad de influenza aumentó ligeramente durante la SE 7 (40% de positividad para influenza). La actividad de neumonía permaneció sobre el umbral estacional; y los casos de IRAG positivos para influenza aumentaron en semanas recientes, y permanecieron bajos en comparación a la temporada anterior.

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en la mayoría de los países. En Puerto Rico, la actividad de influenza permaneció por encima del umbral estacional durante la SE 7, con predominio de influenza A(H3N2).

América Central: La mayoría de los indicadores epidemiológicos se mantienen bajos o en descenso. Se ha reportado actividad moderada de influenza en la región, excepto en Costa Rica, luego de disminuir por varias semanas, la actividad de influenza aumentó y permaneció moderadamente elevada en la SE 7, con predominio de influenza A(H3N2).

Sub-región Andina: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus respiratorios, y de VSR en general. La actividad de influenza disminuyó ligeramente (8% de positividad), y la actividad de VSR (~18% de positividad) permaneció elevada en Colombia. En Ecuador, el porcentaje de hospitalizaciones por IRAG permaneció sobre los niveles históricos, con aumento de las detecciones de influenza.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VSR reflejan una tendencia a disminuir en toda la sub-región. En Chile las detecciones de influenza disminuyeron levemente en la SE 7 y permanecieron con escasas detecciones y 2% de positividad; y las consultas por ETI continuaron en niveles bajos.
En Paraguay, la actividad de ETI disminuyó ligeramente pero permaneció sobre el nivel de alerta en la SE 7, sin actividad de influenza en semanas recientes.

Chikungunya: OPS

SE 09 de 2017

Fuente: OPS

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las Américas, por territorio, SE 09 de 2017.

Subregión	Total casos confirmados autóctonos	Total casos confirmados importados	Total fallecidos
América del Norte	6	3	0
América Central	8	0	0
Caribe Latino	3	0	0
Región Andina	35	0	0
Cono Sur	564	4	1
Caribe no Latino	0	0	0
Total	616	7	1

Tasa de incidencia: 0,46

(autóctonos sospechosos + autóctonos confirmados) / 100.000 hab.

Casos importados en Chile, año 2017

Resumen

- En lo que va corrido del año, se han reportado 616 casos de chikungunya en Las Américas, con 1 fallecido en el Cono Sur.

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional

- **Asia**

Poliovirus Salvaje

SE 09 de 2017

Fuente: **Iniciativa para la erradicación global de la Polio**

Casos poliovirus salvaje tipo 1:



Países	Casos derivados de la vacuna, 2017	Casos derivados de la vacuna, 2016
Afganistán	0	0
Pakistán	0	1
Guinea	0	0
RPD Lao	0	3
Madagascar	0	0
Myanmar	0	0
Nigeria	0	1
Ucrania	0	0
Total	0	4

Resumen: En la SE 09 de 2017, no se reportaron nuevos casos de Poliovirus Salvaje. Tampoco se han registrado casos derivados de la vacuna.

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional

- Sin actualización

Virus Zika en Las Américas

SE 06 de 2017

Fuente: OPS

Desde la semana epidemiológica (SE) 44 de 2016, ningún nuevo país/territorio de las Américas confirmó transmisión autóctona vectorial de Zika. Se mantiene en 48 el número de países y territorios de las Américas que confirmaron casos autóctonos por transmisión vectorial de Zika y en cinco el número de países que notificaron casos de Zika transmitidos sexualmente.

América del Norte: En los Estados Unidos de América, el Departamento de Salud de la Florida continúa registrando casos aislados de transmisión local. En México se observó una tendencia al descenso desde la SE 39 de 2016, con un promedio semanal de 9 casos confirmados en las últimas 4 semanas.

América Central: El número de casos notificados se mantiene estable con un promedio semanal de 369 casos, 317 sospechosos y 52 confirmados, en las últimas cuatro semanas. En Panamá se mantiene una tendencia creciente de casos sospechosos y confirmados entre las SE 30 de 2016 y la SE 1 de 2017.

Caribe: Si bien todos los países/territorios del Caribe siguen notificando casos, la tendencia se mantiene estable, con un promedio semanal de 598 casos sospechosos y confirmados en las últimas cuatro semanas.

América del Sur: El número de casos notificados se mantiene estable con un promedio semanal de 6.601 casos sospechosos y confirmados en las últimas cuatro semanas, de los cuales 6.164 corresponden a Brasil. En Paraguay, se observa una tendencia al ascenso en el número de casos sospechosos entre la SE 42 de 2016 y hasta la SE 3 de 2017. En Perú, se observa un aumento en el número de casos notificados entre las SE 1 y SE 3 de 2017. Dicho aumento está relacionado al brote en curso en el departamento de Loreto. En la República Bolivariana de Venezuela, se observa un aumento en el número de casos notificados entre las SE 1 y 4 de 2017.

Sarampión/Rubeola: OPS

SE 07 del año 2017

Fuente: OPS

Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Américas

Inmunización Integral de la Familia/Familia, Género y Curso de Vida

Vigilancia del sarampión y de la rubéola en las Américas

Vol. 23, No.7

Semana que termina el 18 de febrero del 2017

La tasa de notificación de los casos sospechosos de sarampión y rubéola a nivel regional ha descendido significativamente desde el 2012 y en el 2016 alcanzó su punto más bajo: 1.9 por 100.000 habitantes. Esta reducción drástica se debe a muchos factores, pero principalmente a la presencia de enfermedades por arbovirus como el Zika, Chikungunya y dengue, que han podido enmascarar posibles casos sospechosos de sarampión y rubéola. Los casos de Zika presentan sintomatología clínica similar al de sarampión y la rubéola, como erupción maculopapular, conjuntivitis, mialgia o artralgia.

Tasa de notificación de casos sospechosos de sarampión/rubéola América Latina y el Caribe, 2005-2016*



Fuente: ISIS, MESS y informe de los países.
* Datos hasta la semana epidemiológica 7, 2017.

Sarampión/Rubeola: OPS

SE 07 del año 2017

Fuente: OPS

Clasificación de casos sospechosos de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita (SRC) para el período entre las semanas 01-07, 2017

Subregión y país		Casos sospechosos 2017	Sarampión confirmado 2017			Año/Sem. último caso conf. de sarampión	Rubéola confirmado 2017			Año/Sem. último caso conf. de rubéola	Diagnóstico de casos descartados 2017		Síndrome de Rubéola Congénita			Año/Sem. último caso conf. de SRC
			Clin.	Lab.	Total		Clin.	Lab.	Total		Dengue	Otros	Sosp.	Conf.	IRC*	
AND	BOL	4	…	…	…	2000-40	…	…	…	2006-03	0	2	0	0	0	…
	COL	91	0	0	0	2015-35	0	0	0	2012-31	0	81	31	0	0	2005/34
	ECU	…	…	…	…	2016-14	…	…	…	2004-49	0	0	0	…	…	2011/14
	PER	34	0	0	0	2015-25	0	0	0	2009-04	0	34	0	0	0	2007/16
	VEN	27	0	0	0	2012-17	0	0	0	2015-52	0	23	1	0	0	…
BRA	BRA	81	0	0	0	2015-32	0	0	0	2014-40	0	37	4	0	0	2009/34
CAP	CRI	0	0	0	0	2014-09	0	0	0	2001-39	0	0	21	0	0	…
	GTM	0	0	0	0	1998-05	0	0	0	2006-31	0	0	1	0	0	2005/00
	HND	1	0	0	0	1998-16	0	0	0	2004-11	0	1	0	0	0	2001/00
	NIC	8	0	0	0	1994/14	…	…	…	2004-19	0	6	9	0	0	2005/00
	PAN	8	0	0	0	2011-20	0	0	0	2002-48	0	4	0	0	0	…
	SLV	17	0	0	0	2001-19	0	0	0	2006-30	0	9	0	0	0	2001/00
CAR	CAR	21	0	0	0	2011/48	0	0	0	2008/18	0	19	0	0	0	1999/00
LAC	CUB	…	…	…	…	1993/27	…	…	…	2004/06	…	…	…	…	…	…
	DOM	0	0	0	0	2011-18	0	0	0	2007-45	0	0	0	0	0	…
	HTI	7	0	0	0	2001-39	0	0	0	2006-21	0	1	27	0	0	…
MEX	MEX	321	0	0	0	2015-02	0	0	0	2001-25	0	239	0	0	0	…
NOA	CAN	…	…	3	3[a]	2017/06	0	0	0	2016/06	0	0	0	0	0	2015/50
	USA	…	…	13	13[a]	2017/04	…	…	…	2016/03	0	0	0	…	…	2015/00
SOC	ARG	22	0	0	0	2014-33	0	0	0	2014-22	0	13	4	0	0	2009/27
	CHL	27	0	0	0	2015-27	0	0	0	2011-25	0	26	0	0	0	…
	PRY	71	0	0	0	1998-44	0	0	0	2005-21	0	68	0	0	0	2003/06
	URY	…	…	…	…	1999/08	…	…	…	2001/37	…	…	…	…	…	…
TOTAL		**740**	**0**	**16**	**16**	**--**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**563**	**98**	**0**	**0**	**--**

*Infección de rubéola congénita; (a)Datos provisionales. …No se recibió informe

- Entre las Semanas Epidemiológicas 1 y 7 de 2017, se han reportado 16 casos de sarampión en Las Américas: 3 en Canadá y 13 en Estados Unidos.
- En el mismo período, Chile ha reportado 27 casos sospechosos de sarampión.
- No se han registrado casos de Rubeola.

MERS-CoV

SE 07 de 2017

Fuentes: OMS

Última actualización
Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV)

Entre el 10 de enero y el 3 de febrero de 2017, el punto focal internacional del Reglamento Sanitario Internacional de Arabia Saudita, informó a la OMS de diecisiete (17) casos nuevos de Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS) incluyendo cuatro (4) casos fatales. También se informaron tres (3) defunciones entre los casos de MERS notificados.

Uno de los casos reportados es un trabajador de salud. El limitado brote en Buridah, Arabia Saudita informado el 26 de enero de 2017, ha terminado.

Un total de 6 casos estuvieron relacionados con este brote hospitalario.

A la fecha se ha seguido a todos los contactos durante un período de 14 días y no se han identificado más casos.

A nivel mundial, desde septiembre de 2012, se han notificado a la OMS 1.905 casos confirmados por laboratorio de infección por MERS-CoV, que incluyen al menos 677 muertes relacionadas.

Evaluación de riesgos de la OMS

MERS-CoV causa infecciones humanas graves que resultan en una alta mortalidad y ha demostrado la capacidad de transmitirse entre los seres humanos.

Hasta el momento, la transmisión observada de humano a humano se ha producido principalmente en entornos de atención de salud.

La notificación de casos adicionales no modifica la evaluación general del riesgo.

La OMS espera que se informen casos nuevos y que estos continúen siendo exportados a otros países por personas que podrían adquirir la infección después de la exposición a animales o productos de origen animal (por ejemplo, Dromedarios) o la fuente humana (por ejemplo, en un establecimiento de atención médica).

La OMS sigue vigilando la situación epidemiológica y realiza una evaluación del riesgo basada en la información más reciente disponible.

Noticias Internacionales

Noticias Internacionales: América

06 de Marzo de 2017

Fuente: Elnuevoherald.com; Prensa-latina.cu; Rcinet.ca; Analisisdigital.com.ar

Estados Unidos

Confirman segundo caso de mapache con rabia; urgen cuidado a residentes en Miami

VIDEOS

Sacrifican miles de pollos en EE.UU. por gripe aviar

Washington, 6 mar (PL) Unos 73 mil 500 pollos fueron sacrificados en una granja comercial del estado norteamericano de Tennesse para evitar la propagación de la gripe aviar H7, confirmaron hoy fuentes oficiales.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura, esta es la primera vez en 2017 que se confirma la enfermedad en aves de corral destinadas al mercado.

Canadá

El virus del Zika puede causar la microcefália en los bebés.
Photo Credit: Getty/Mario Tama

Complicaciones de canadienses infectados con Zika causan sorpresa

Argentina

Una de ellas es Corrientes, limítrofe con Entre Ríos

Dos provincias argentinas, en riesgo por un brote de fiebre amarilla en Brasil

Mientras en Brasil aumentan los casos de fiebre amarilla en 169 municipios de siete estados y las autoridades sanitarias confirman más muertes de monos aulladores por el virus en las áreas silvestres del país, crece la alerta para contener su avance geográfico y vacunar en las franjas periurbanas. Colombia, Bolivia y Perú también registraron casos, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Ante este escenario,

Noticias Internacionales: África

06 de marzo de 2017

Fuente: Prensalatina.cu; Prensalatina.cu

Nigeria

Miles de aves muertas por gripe aviar en Nigeria

Abuja, 27 feb (PL) Un brote de gripe aviar en el central estado nigeriano de Plateau causó desde enero hasta hoy la muerte de 42 mil aves de corral, una pérdida enorme de ingresos, según avicultores.

Para los productores, esos decesos plantean también enormes riesgos con los consumidores de productos avícolas. La Asociación de Avicultura de Nigeria dio la cifra este lunes.

Somalía

Brote de cólera mata a casi 200 personas en Somalia

Noticias Internacionales: Europa

06 de Marzo de 2017

Fuente: Biotech-spain.com

Holanda

Un estudio experimental demuestra que las llamas y los cerdos son susceptibles al virus MERS-CoV

Salud animal

Ministerio de Salud

Gobierno de Chile

TODOS x CHILE!