Ministerio de Salud

Gobierno de Chile

Boletín de Vigilancia

Eventos de Salud Pública
SE 11 de 2017

(12 AL 18 de marzo)

Centro Nacional de Enlace
Departamento de Epidemiología
División de Planificación Sanitaria
Ministerio de Salud

Objetivo

Mantener un sistema de vigilancia basado en eventos de salud pública de interés nacional e internacional, que podrían llegar a tener un impacto en la salud de la población chilena.

Características

La información proveniente de fuentes formales es considerada como confiable y veraz. Cuando se trata de una fuente informal, la confiabilidad de la información no está establecida y/o se debe verificar.

Fuentes de Información

Fuentes de Información	Formales	Informales
	OMS	Comunidad
	OPS	Redes Sociales
	Ministerios Públicos	ONG
	Instituto de Salud Pública	Sector Privado
	SEREMI/ Servicios de Salud	Redes de Alerta
	Web de sitios oficiales	Medios de Comunicación

Tabla de Contenido

SE 11 de 2017

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional
- Hantavirus
- Fragata Portuguesa
- Carne contaminada proveniente de Brasil
- Marea Roja en Los Ríos

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional Sin Actualización
- influenza

Eventos con potencial impacto para la salud pública
Noticias nacionales de salud pública

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (América)
- Fiebre Amarilla en las Américas
- Influenza en las Américas
- Chikungunya
- Sarampión/Rubeola en Las Américas

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (Asia)
- Poliovirus Salvaje

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional Sin Actualización
- Virus Zika en las Américas
- MERS-CoV

Noticias internacionales de salud pública

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional

Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)

SE 11 de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, al 20 de marzo de 2017:

A la fecha, se han confirmado **46 casos de SCPH** en el país, por sobre lo esperado, según mediana quinquenal (19 casos) y según lo observado el 2016 (18 casos), para el mismo período.
Se registran **8 fallecidos (17,4% letalidad),** distribuidos en Los Ríos (2), Araucanía (2), Maule, Biobío, Los Lagos y no determinado (1 caso, respectivamente). Estos datos de defunción están sobre lo observado el 2016 (4 fallecidos) y similar a la mediana del último quinquenio (7).
Los casos presentan las siguientes características:

- 71,7% de sexo masculino (33).
- Mediana de edad 39,5 años (rango 3 y 83 años).
- Probable lugar de infección: Biobío (9), Los Ríos (8), Los Lagos (8), Araucanía (6), Maule (4), O'Higgins (2), Aysén (1), Valparaíso (1) y RM (1). 6 de los casos aún en estudio.
- Actividad: trabajadores agrícolas (12), estudiantes (11), trabajadores forestales (4), dueña de casa (3); lo otros 16 casos presentan otras actividades.
- De los pacientes sobrevivientes (38), 18 han sido dados de alta, y de los 20 hospitalizados, 5 están en el Hospital del Tórax, 5 en el Hospital de Concepción, 3 en la Clínica Las Condes, , 3 en Hospital Higueras, 2 en Clínica Alemana de Santiago, 1 en Hospital de Temuco y 1 en la Clínica U. de Los Andes.

Casos de SCPH, por comuna de infección. Chile, Enero 2017 a la fecha.



Casos SCPH, por comuna de infección*.		
Región	Comuna	2017
Valparaíso	Zapallar	1
	Subtotal	*1*
O´higgins	NAVIDAD	1
	Subtotal	*1*
Maule	LINARES	1
	LONGAVÍ	1
	MOLINA	1
	PARRAL	1
	Subtotal	*4*
Biobío	ARAUCO	1
	LOS ANGELES	1
	PINTO	1
	SAN CARLOS	2
	SANTA BÁRBARA	1
	TOMÉ	1
	YUNGAY	1
	Subtotal	*8*
Araucanía	CUNCO	1
	GORBEA	1
	TEODORO SCHMIDT	1
	VICTORIA	3
	Subtotal	*6*
Los Ríos	CORRAL	1
	LAGO RANCO	1
	LOS LAGOS	2
	VALDIVIA	3
	Subtotal	*7*
Los Lagos	FUTALEUFU	1
	HUALAIHUE	1
	LOS MUERMOS	1
	PUERTO VARAS	1
	PURRANQUE	1
	RIO NEGRO	1
	Subtotal	*6*
Aisén	AISÉN	1
	Subtotal	*1*
*** TOTAL al 20 de MARZO 2017**		**34**

* No se incluye otros **12** casos en el mapa, por ser indeterminado el lugar de infección.

Fragata Portuguesa

20 de Marzo de 2017

Fuente: División de Políticas Públicas, DIPOL. Ministerio de Salud

A continuación se presenta el estado de las playas con prohibición de baño por presencia de fragata portuguesa, actualizado al viernes 17 de marzo a las 15:00 horas:

Región	Playa	Comuna
Bio Bío	Playa Maule	Coronel
Bio Bío	Playa Schwager	Coronel
Bio Bío	Caleta Lo Rojas	Coronel
Bio Bío	Playa del Sector Caleta Yani	Arauco
Araucanía	Playa de Boca Budi	Puerto Saavedra
Araucanía	Playa Maule	Puerto Saavedra
Araucanía	Playa Moncul	Carahue

Carne contaminada proveniente de Brasil

20 de Marzo de 2017

Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Chile amplía cierre temporal de mercado a todo tipo de carnes provenientes de Brasil

Twittear

Esto incluye las importaciones de carnes de bovino, ave y cerdo desde esa nación.

El cierre temporal para el ingreso de todo tipo de carne brasileña a nuestro país anunció este mediodía el Ministerio de Agricultura, en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). La medida fue gatillada tras el anuncio de las autoridades de Brasil de la existencia de una red de corrupción al interior diversas plantas frigoríficas de ese país y de las instituciones encargadas del control sanitario de este producto, lo que permitía el comercio para mercado interno y externo de carne adulterada.

Marea Roja en Los Ríos

20 de Marzo de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

Me gusta Compartir 0 Tweet

20 de Marzo de 2017

Seremi de Salud de Los Ríos prohibió la extracción de loco por Marea Roja en Chaihuín, Huiro y Hueicolla

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional Sin Actualización

Influenza en Chile

SE 09 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

La notificación de ETI en la semana 9 disminuye respecto a la semana previa y se presenta bajo del promedio de la curva epidémica. Se registran casos de influenza A en el centinela de Iquique.

En las urgencias hospitalarias las atenciones por ETI y neumonía bajan levemente respecto a la semana previa.

Se registra baja positividad a virus respiratorios en la vigilancia de IRAG en las primeras semanas del año. En la semana 7 se detecta un aumento de casos IRAG asociada a influenza A(H3N2) en Iquique.

Se requiere mantener activo todos los componentes de la Vigilancia de influenza para la detección y manejo de los casos según las guías clínica y de vigilancia de Influenza. En especial la notificación y toma de muestras en los centros centinela de ETI e IRAG.

Notificación de Enfermedad Tipo Influenza en Atención Primaria. Umbral de Alerta (&)
Chile, SE 9, 2017 (comparado con 2012-2016)



Fuente: Vigilancia Centinela de ETI. Dpto. Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.
& En base a método de Curva Epidémica y Umbrales de Alerta, OPS/OMS

Tasa de Enfermedad Tipo Influenza en Atención Primaria
Chile, 2013-2017 (SE 9).



Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Dpto. Epidemiología, DIPLAS/MINSAL.

Eventos con potencial impacto para la Salud Pública

Últimos sismos registrados

20 de Marzo de 2017

Fuente: Sismología

Fecha Local	Lugar	Magnitud
2017/03/20 15:16:54	92 km al NE de Socaire	3.9 Ml
2017/03/20 09:34:08	30 km al O de Colina	3.4 Ml
2017/03/20 07:39:26	23 km al N de Los Vilos	3.4 Ml
2017/03/20 07:04:14	83 km al S de Socaire	4.1 Ml
2017/03/20 05:51:41	40 km al O de Los Vilos	3.4 Ml
2017/03/20 05:14:58	19 km al S de Talca	3.0 Ml
2017/03/20 01:31:38	2 km al NE de La Serena	3.6 Ml
2017/03/20 00:01:08	75 km al SE de Socaire	4.3 Ml
2017/03/19 21:39:23	**28 km al SO de Vallenar**	**4.7 Mw**
2017/03/19 19:07:51	77 km al O de Quellón	3.5 Ml
2017/03/19 18:59:00	55 km al SE de Sierra Gorda.	3.1 Ml
2017/03/19 14:57:01	29 km al E de Pica	3.4 Ml
2017/03/19 11:14:36	72 km al SE de Socaire	3.8 Ml
2017/03/19 09:29:32	46 km al S de Socaire	3.4 Ml
2017/03/19 09:25:25	45 km al SE de Camiña	3.1 Ml

Monitoreo de actividad volcánica

20 de Marzo de 2017

Fuente: Sernageomín

ZONA NORTE

Guallatiri	
Irruputuncu	
Láscar	
Olca	
Parinacota	
San Pedro y San Pablo	
VER MAS	
Taapaca	
Isluga	
Ollagüe	
Lastarria	

ZONA CENTRO

Planchón - Peteroa	
Descabezado Grande y	
Tinguiririca	
San José	
Tatara - San Pedro	
Nevado de Longaví	
VER MAS	
Laguna del Maule	
Tupungatito	

ZONA SUR

Lanín	
Nevados de Chillán	
Copahue	
Antuco	
Calbuco	
Callaqui	
VER MAS	
Chaitén	
Corcovado y Yanteles	
Hudson	
Villarrica	
Llaima	
Lonquimay y Tolhuaca	
Mocho - Choshuenco	
Osorno	
Puyehue - Cordón Ca	
Quetrupillán	
Sollipulli	
Antillanca - Casabla	
Carrán-Los Venados	
Yate y Hornopirén	
Michinmahuida	
Melimoyu	
Macá y Cay	
Mentolat	
Huequi	

Radiación Ultravioleta

20 de Marzo de 2017

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

REGIÓN	RADIACIÓN UV
Arica y Parinacota	
Tarapacá	
Antofagasta	
Atacama	
Coquimbo	
Valparaíso	
Metropolitana	
O´Higgins	
Maule	

REGIÓN	RADIACIÓN UV
Biobío	
Araucanía	
Los Ríos	
Los Lagos	
Aysén	
Magallanes y Antártica	
Isla de Pascua	
Juan Fernández	
Antártica	

Nota: Este pronóstico tiene validez de tres días (a partir del 02 de septiembre) y solo aplica para una condición de día despejado

Alertas ONEMI

20 de Marzo de 2017

Fuente: ONEMI

20/03/2017 | 14:58 | Maule

Se declara Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Romeral, Curicó, Molina, San Clemente, Colbún, Linares, Retiro y Parral por precipitaciones y tormentas eléctricas

20/03/2017 | 14:42 | Maule

Se actualiza Alerta Temprana Preventiva para la Región del Maule por incendios forestales

20/03/2017 | 13:58 | Metropolitana

Se actualiza Alerta Temprana Preventiva para las comunas de San José de Maipo, Pirque, Puente Alto, Peñalolén, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina y La Florida, por precipitaciones y tormentas eléctricas

20/03/2017 | 13:15 | Valparaíso

Se actualiza Alerta Temprana Preventiva para las provincias de Los Andes y San Felipe y las comunas de Petorca, La Ligua y Cabildo, por precipitaciones y tormentas eléctricas

20/03/2017 | 13:08 | Coquimbo

Se actualiza Alerta Temprana Preventiva para las comunas de La Higuera, Vicuña, Paihuano, Río Hurtado, Monte Patria, Combarbalá, Illapel y Salamanca por precipitaciones y tormentas eléctricas

20/03/2017 | 13:03 | Lib. Gral Bernardo O'Higgins

Se actualiza Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Codegua, Machalí, Rengo, San Fernando y Chimbarongo, por precipitaciones y tormentas eléctricas

Noticias Nacionales

Noticias nacionales

20 de Marzo de 2017

Fuente: Teletrece.cl; Terra.cl: Biobiochile.cl; Biobiochile.cl;

Región Metropolitana

Chilenos crean una vacuna para combatir el virus sincicial

La fórmula para combatir la enfermedad será utilizada principalmente en recién nacidos, y podría reemplazar a la actual dosis contra la tuberculosis.

por T13 |

Subsecretaria de Redes Asistenciales por influenza: "Este invierno viene crudo"

Indicó que el foco de la campaña ahora está puesto en los adultos mayores, quienes pueden inocularse u obtener la vacuna en forma gratuita.

14 MAR 2017 16h14

0 COMENTARIOS

Este invierno viene crudo y por eso que estamos advirtiendo a la población, señaló la subsecretaria de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, **Gisela Alarcón,** en el lanzamiento de la campaña 2017 de vacunación contra la influenza.

Los Lagos

Chile cierra importaciones de carne de Brasil ante escándalo por adulteraciones

Confirman que intoxicación de 33 profesores en Río Negro fue por salmonella tipo B

Noticias nacionales

20 de Marzo de 2017

Fuente: Biobiochile.cl; Biobiochile.cl

Biobío

Confirman presencia de fragata portuguesa en dos playas de Cobquecura

Los Ríos

Detectan niveles tóxicos de marea roja en locos en la zona sur de la región de Los Ríos

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional

- América

Fiebre Amarilla en Las Américas

SE 09 de 2017

Fuente: OPS

Desde la semana epidemiológica (SE) 1 y hasta la SE 9 de 2017, Brasil, Colombia, el Estado Plurinacional de Bolivia, y Perú, han notificado casos sospechosos y confirmados de fiebre amarilla.

Brasil: Desde el inicio del brote en diciembre de 2016 y hasta el 13 de marzo de 2017, se notificaron 1.538 casos de fiebre amarilla (396 confirmados, 184 descartados y 958 sospechosos que permanecen en investigación) incluidas 255 defunciones (134 confirmadas, 9 descartadas y 112 en investigación).

La tasa de letalidad entre los casos confirmados es de 34% y de 12% entre los casos sospechosos.

De acuerdo al sitio probable de infección, el 79% de los casos sospechosos y confirmados se notificaron en Minas Gerais (1.070), seguido de Espírito Santo (245), São Paulo (15), Bahía (9), Tocantins (6), Goiás (3) y Rio Grande do Norte (1). Mientras que los casos confirmados, se distribuyen en tres estados: Minas Gerais (303), Espírito Santo (89), y São Paulo (4).

En el estado de Minas Gerais, se mantiene la tendencia al descenso de casos sospechosos y confirmados por quinta semana consecutiva. En Espírito Santo, los casos han presentado una tendencia al descenso a partir de la SE 5 de 2017 y habrá que seguir observando la evolución de la epidemia.

Ecuador: en la SE 10 de 2017, el Centro Nacional de Enlace (CNE) para el RSI notificó a la OPS/OMS un caso confirmado de fiebre amarilla en un paciente de sexo masculino de 31 años, residente en la provincia de Sucumbíos, situado en la frontera con Colombia. El caso fue confirmado por el Laboratorio de Referencia Nacional, a través de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. No se notificaba un caso de fiebre amarilla desde 2012, cuando se registró un caso confirmado en la provincia de Napo.

Estado Plurinacional de Bolivia: En la SE 6 de 2017, el CNE para el RSI notificó a la OPS/OMS un caso de fiebre amarilla, con resultado positivo para IgM por la técnica de ELISA. El caso, corresponde a un turista, sexo masculino, de 28 años de edad, no vacunado que llegó a Bolivia el 8 de enero de 2017 y el 9 de enero se trasladó al municipio de Caranavi, lugar donde probablemente adquirió la infección.

Perú: Hasta la SE 9 de 2017, se notificaron 7 casos confirmados y probables de fiebre amarilla, incluidas dos defunciones. El departamento de Ayacucho notificó tres casos confirmados de fiebre amarilla en los distritos de Sivia y Santa Rosa, incluida una defunción del distrito Santa Rosa. Los cuatro casos restantes fueron notificados como casos probables por los departamentos de Amazonas (2), San Martin (1) y Pasco (1) 3,4.

Influenza: OPS

SE 09 del año 2017

Fuente: OPS

América del Norte: En Canadá, la actividad de influenza disminuyó (22%), con predominio de influenza A(H3N2), y las consultas por Enfermedad Tipo Influenza (ETI), durante la SE 9 (2,2%) disminuyeron ligeramente, en comparación con la semana previa. En Estados Unidos, la positividad de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) (13,4%), disminuyó ligeramente y la actividad de influenza (18,6%) disminuyó levemente, con predominio de influenza A(H3N2). La actividad de ETI se ubicó sobre la línea de base nacional de 2,2%. En México, la actividad de influenza aumentó ligeramente durante la SE 9 (~48% de positividad para influenza), con predominio de influenza A(H1N1)pdm09. La actividad de neumonía permaneció sobre el umbral estacional; y los casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) positivos para influenza, aumentaron en semanas recientes, y permanecieron bajos en comparación a la temporada anterior. Los casos de IRAG fallecidos asociados a influenza, aumentaron.

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en la mayoría de los países. En Puerto Rico, la actividad de influenza disminuyó por debajo del umbral estacional durante la SE 9, con predominio de influenza A(H3N2). En Jamaica, la actividad de IRAG aumentó, pero permaneció debajo del umbral de alerta.

América Central: La mayoría de los indicadores epidemiológicos se mantienen bajo. Se ha reportado actividad moderada de influenza en la región. En Costa Rica, luego de disminuir por varias semanas, la actividad de influenza aumentó y permaneció moderadamente elevada en la SE 9, con predominio de influenza A(H3N2).

Sub-región Andina: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus respiratorios, y de VRS en general. Durante la SE 9, la actividad de influenza disminuyó ligeramente (18% de positividad), y la actividad de VRS (~18% de positividad) permaneció elevada en Colombia. En Ecuador, el porcentaje de hospitalizaciones por IRAG disminuyó y permaneció sobre los niveles históricos, con aumento de las detecciones de influenza.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VRS reflejan una tendencia a disminuir en toda la sub-región. En Brasil, los casos acumulados de IRAG y fallecidos durante la SE 9 fueron superiores a los niveles en 2015-2016; y la mayoría de los casos de IRAG se reportaron en la región suroeste. En Chile las detecciones de influenza aumentaron levemente en la SE 8 y permanecieron con escasas detecciones y 4% de positividad; y las consultas por ETI continuaron en niveles bajos. En Paraguay, la actividad de ETI disminuyó ligeramente pero permaneció sobre el nivel de alerta en la SE 8, sin actividad de influenza en semanas recientes.

Global: La actividad de influenza en la zona templada del hemisferio norte continuó siendo elevada. Muchos países, especialmente en Asia Oriental y Europa, parecen haber alcanzado ya su pico y reportaron tendencias decrecientes. En todo el mundo, predominó el virus influenza A(H3N2).

Chikungunya: OPS

SE 11 de 2017

Fuente: OPS

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las Américas, por territorio, SE 11 de 2017.

Subregión	Total casos confirmados autóctonos	Total casos confirmados importados	Total fallecidos
América del Norte	8	3	0
América Central	8	1	0
Caribe Latino	5	0	0
Región Andina	61	0	0
Cono Sur	2.178	2	1
Caribe no Latino	0	0	0
Total	2.260	6	1

Tasa de incidencia: 1,21

(autóctonos sospechosos + autóctonos confirmados) / 100.000 hab.

Casos importados en Chile, año 2017

Resumen

- En lo que va corrido del año, se han reportado 2.260 casos de chikungunya en Las Américas, con 1 fallecido en el Cono Sur.

Sarampión/Rubeola: OPS

SE 10 del año 2017

Fuente: OPS

Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Oficina Regional para las Américas

Inmunización Integral de la Familia/Familia, Género y Curso de Vida

Vigilancia del sarampión y de la rubéola en las Américas

Vol. 23, No.10

Semana que termina el 11 de marzo del 2017

Proporción de casos sospechosos de sarampión/rubéola con clasificación final. Las Américas, 2016*

Todos los casos sospechosos de sarampión y rubéola del 2016 que están pendientes de clasificación, deben ser revisados para descartarlos o confirmarlos.
Existe la actual amenaza de que las arbovirosis enmascaren los verdaderos casos de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita.



Sarampión/Rubeola: OPS

SE 10 del año 2017

Fuente: OPS

Clasificación de casos sospechosos de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita (SRC) para el período entre las semanas 01-10, 2017

Subregión y país		Casos sospe-chosos 2017	Sarampión confirmado 2017			Año/Sem. último caso conf. de sarampión	Rubéola confirmado 2017			Año/Sem. último caso conf. de rubéola	Diagnóstico de casos descartados 2017		Síndrome de Rubéola Congénita			Año/Sem. último caso conf. de SRC
			Clin.	Lab.	Total		Clin.	Lab.	Total		Dengue	Otros	Sosp.	Conf.	IRC*	
AND	BOL	5	…	…	…	2000-40	…	…	…	2006-03	0	5	0	0	0	…
	COL	128	0	0	0	2015-35	0	0	0	2012-31	0	122	71	0	0	2005/34
	ECU	0	…	…	…	2016-14	…	…	…	2004-49	0	0	0	…	…	2011/14
	PER	53	0	0	0	2015-25	0	0	0	2009-04	0	49	0	0	0	2007/16
	VEN	59	0	0	0	2012-17	0	0	0	2015-52	0	54	2	0	0	…
BRA	BRA	163	0	0	0	2015-32	0	0	0	2014-40	0	118	7	0	0	2009/34
CAP	CRI	0	0	0	0	2014-09	0	0	0	2001-39	0	0	21	0	0	…
	GTM	15	0	0	0	1998-05	0	0	0	2006-31	0	13	1	0	0	2005/00
	HND	7	0	0	0	1998-16	0	0	0	2004-11	0	3	1	0	0	2001/00
	NIC	8	0	0	0	1994/14	…	…	…	2004-19	0	6	9	0	0	2005/00
	PAN	8	0	0	0	2011-20	0	0	0	2002-48	0	4	0	0	0	…
	SLV	27	0	0	0	2001-19	0	0	0	2006-30	0	18	0	0	0	2001/00
CAR	CAR	27	0	0	0	2011/48	0	0	0	2008/18	0	23	0	0	0	1999/00
LAC	CUB	0	…	…	…	1993/27	…	…	…	2004/06	0	0	0	…	…	…
	DOM	2	0	0	0	2011-18	0	0	0	2007-45	0	0	0	0	0	…
	HTI	15	0	0	0	2001-39	0	0	0	2006-21	0	1	2	0	0	…
MEX	MEX	536	0	0	0	2015-02	0	0	0	2001-25	0	406	0	0	0	…
NOA	CAN	…	…	9	9[a]	2017/09	0	0	0	2016/06	0	0	0	0	0	2015/50
	USA	…	…	13	13[a]	2017/04	…	…	…	2016/03	0	0	0	…	…	2015/00
SOC	ARG	27	0	0	0	2014-33	0	0	0	2014-22	0	17	17	0	0	2009/27
	CHL	31	0	0	0	2015-27	0	0	0	2011-25	0	29	0	0	0	…
	PRY	111	0	0	0	1998-44	0	0	0	2005-21	0	108	0	0	0	2003/06
	URY	0	…	…	…	1999/08	…	…	…	2001/37	0	0	0	…	…	…
TOTAL		**1094**	**0**	**22**	**22**	**--**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**976**	**131**	**0**	**0**	**--**

*Infección de rubéola congénita; (a)Datos provisionales. …No se recibió informe

- Entre las Semanas Epidemiológicas 1 y 10 de 2017, se han reportado 22 casos de sarampión en Las Américas: 9 en Canadá y 13 en Estados Unidos.
- En el mismo período, Chile ha reportado 31 casos sospechosos de sarampión.
- No se han registrado casos de Rubeola.

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional

- **Asia**

Poliovirus Salvaje

SE 11 de 2017

Fuente: **Iniciativa para la erradicación global de la Polio**

Casos poliovirus salvaje tipo 1:



Países	Casos derivados de la vacuna, 2017	Casos derivados de la vacuna, 2016
Afganistán	0	0
Pakistán	0	0
Guinea	0	0
RPD Lao	0	2
Madagascar	0	0
Myanmar	0	0
Nigeria	0	0
Ucrania	0	0
Total	0	2

Resumen: En la SE 11 de 2017, se reportó un nuevo caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1), en el distrito de Diamir, provincia de Gilgit Baltistan. El caso tuvo inicio de parálisis el 13 de febrero, por lo que el número total de casos de WPV1 para 2017, en ese país, asciende a dos.

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional

- Sin actualización

Virus Zika en Las Américas

SE 10 de 2017

Fuente: OPS

Desde la semana epidemiológica (SE) 44 de 2016, ningún nuevo país/territorio de las Américas ha confirmado transmisión autóctona vectorial de Zika. Se mantiene en 48 el número de países y territorios de las Américas que confirmaron casos autóctonos por transmisión vectorial de Zika y en cinco el número de países que notificaron casos de Zika transmitidos sexualmente.

América del Norte: En los Estados Unidos de América, el Departamento de Salud del estado de Florida, informó que continúa registrando casos aislados de transmisión local. Por su parte México, continúa notificando casos nuevos, aunque con tendencia decreciente desde la SE 40 de 2016.

América Central: El número de casos notificados sigue con tendencia decreciente con un promedio semanal de 335 casos (275 sospechosos y 60 confirmados), en las últimas cuatro semanas (SE 6 a SE 9 de 2017).En Costa Rica se notificó un ligero aumento de casos sospechosos y confirmados en la SE 5 de 2017. En Panamá se registró una tendencia creciente de casos sospechosos y confirmados entre la SE 30 de 2016 a la SE 1 de 2017.

Caribe: En Aruba se notificó una tendencia al ascenso en el número de casos sospechosos y confirmados entre las SE 29 de 2016 y SE 4 de 2017. En las últimas cuatro semanas, se notificó un promedio semanal de 53 casos sospechosos y confirmados. En Curacao se observó una tendencia al ascenso en el número de casos sospechosos y confirmados entre las SE 31 y SE 47 de 2016. En Guadalupe y Martinica se continúa registrando una circulación baja del virus con unos pocos casos aislados confirmados en las últimas cinco semanas (SE 1 a SE 5 de 2017). Si bien el resto de los países/territorios del Caribe siguen notificando casos, se observa una tendencia decreciente en la sub región, con un promedio semanal de 340 casos en las últimas cuatro semanas.

América del Sur: En Argentina en la SE 8 de 2017 fueron confirmados por primera vez dos casos autóctonos, uno en la provincia de Salta y el otro en la provincia de Chaco, este último con antecedente de haber permanecido en la provincia de Formosa durante el periodo probable de contagio. En el año 2016 fueron confirmados casos autóctonos en las provincias de Córdoba y Tucumán. En Paraguay, se observa una tendencia al ascenso en el número de casos sospechosos entre la SE 42 de 2016 y hasta la SE 5 de 2017. En Perú, se observa un aumento en el número de casos notificados especialmente entre las SE 1 y SE 3 de 2017, dicho aumento está relacionado al brote en curso en el departamento de Loreto. En 2017 se notificaron casos en nuevos distritos de los departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali. En el resto de países, el número de casos notificados se mantiene estable con un promedio semanal de 396 casos (353 sospechosos y 43 confirmados) en las últimas cuatro semanas.

MERS-CoV

SE 10 de 2017

Fuentes: OMS

Última actualización
Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV)

Entre el 6 y el 21 de febrero de 2017, el Punto Focal del Reglamento Sanitario Internacional de Arabia Saudita, informó de doce (12) casos nuevos de Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS), incluyendo tres (3) casos fatales.

También se informaron cuatro (4) muertes entre los casos de MERS notificados anteriormente.

La mayoría de estos casos son casos primarios. con exposición a camellos dromedarios infectados o al consumo de su leche cruda, que es la fuente más probable de su infección.

A nivel mundial, desde septiembre de 2012, se han notificado a la OMS 1-917 casos confirmados por laboratorio de infección por MERS-CoV, incluidos al menos 684 muertes relacionadas.

Evaluación de riesgos de la OMS

MERS-CoV causa infecciones humanas graves que resultan en una alta mortalidad y ha demostrado la capacidad de transmitirse entre los seres humanos.

Hasta el momento, la transmisión observada de humano a humano se ha producido principalmente en entornos de atención de salud.

La notificación de casos adicionales no modifica la evaluación general del riesgo.

La OMS espera que se informen casos nuevos y que estos continúen siendo exportados a otros países por personas que podrían adquirir la infección después de la exposición a animales o productos de origen animal (por ejemplo, Dromedarios) o la fuente humana (por ejemplo, en un establecimiento de atención médica).

La OMS sigue vigilando la situación epidemiológica y realiza una evaluación del riesgo basada en la información más reciente disponible.

Noticias Internacionales

Noticias Internacionales: América

20 de Marzo de 2017

Fuente: Sumedico.com; Nmnoticias.ca; Eltiempo.com

Venezuela

Problemas cardiacos la nueva amenaza del zika

Nueve pacientes venezolanos sufrieron problemas cardiacos tras presentar síntomas del Zika

14/03/2017 | 12:01 | Redacción Su Médico /

Canadá

Brote de paperas en Toronto: van 43 casos

Publicado en: Ciudad Por: Redacción NM

Temas: Brampton | brote de paperas | Mississauga | Oficina de Salud Pública de Peel | Oficina de Salud Pública de Toronto | parotiditis | región de Peel | salud pública | síntomas de las paperas | Toronto

Colombia

Muerte de indígenas kogui fue por infección respiratoria aguda

INS y Gobernación del Cesar descartaron fiebre amarilla como causa del deceso en la Sierra Nevada.

Comentar
Facebook
Twitter
Google+
Linked in
Enviar
Guardar

Noticias Internacionales: América

20 de Marzo de 2017

Fuente: Xeu.com.mx; Radiouchile.cl;

Brasil

Reportan primera muerte en Río de Janeiro por brote de fiebre amarilla

15 mar 2017 2:14 PM

Por: Redacción - xeu Noticias

Twittear | 2 | Me gusta | Compartir

Un hombre de 38 años murió el pasado fin de semana en Río de Janeiro a causa de la fiebre amarilla, el primer caso en este estado de Brasil, mientras el número de infectados llega a 400 en la región sureste, por lo que las autoridades planean vacunar a millones de personas.

AL MINUTO

13:28 carretera federal Perote-Amozoc

13:22 Bloquean plazas comerciales en Oaxaca

13:15 El Tiburón Sub-20 afina detalles para visitar a Chivas

Brasil exportó toneladas de carne podrida y con salmonela

RFI |Sábado 18 de marzo 2017 18:46 hrs.

Noticias Internacionales: África

20 de marzo de 2017

Fuente: Telesurtv.net; Vtv.gob.ve; Terra.cl

Mozambique

Mozambique alertó nuevo brote de cólera con miles de contagios

Burundí

Burundi declara epidemia de malaria por 700 muertes en 2017

Publicado el 15/Mar 2017 a las: 9:50 pm **Por: Rebeca Rodríguez**

Egipto

Egipto investiga la intoxicación alimentaria de 3.356 niños en colegios

16 MAR 2017 11h14

0 COMENTARIOS

El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, ordenó hoy investigar un caso de intoxicación alimentaria que ha afectado a 3.356 estudiantes de primaria de los colegios públicos en la provincia de Suhag, en sur del país.

Noticias Internacionales: Asia

20 de marzo de 2017

Fuente: Eldiario.ec; Vietnamplus.vn

Siria

Brote de sarampión avanza a pasos rápidos en las afueras de Damasco

Vietnam

Registran nuevo brote de gripe aviar A/H5N6 en provincia vietnamita

NGUYỄN ĐOAN TRANG SOURCE LUNES, 20 DE MARZO DE 2017 - 17:09:00 IMPRESIÓN

NOTICIAS RELACIONADAS

Hanoi realiza simulacro de prevención contra gripe aviar

Vietnam suspende importación de aves de EE.UU para contener gripe aviar

Hanoi establece línea telefónica directa para actividades contra gripe aviar

Quang Tri, Vietnam, 20 mar (VNA)- Un brote del virus tipo A/H5N6 de la gripe aviar fue detectado en esta provincia central, informó hoy el Departamento de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam.

Noticias Internacionales: Europa

20 de Marzo de 2017

Fuente: Teletica.com; Redaccionmedica.com

Italia

Italia preocupada por aumento de sarampión

FOTOS (1)

Rumania

Las autoridades culpan a los antivacunas del brote de sarampión rumano

La enfermedad ha causado la muerte de al menos 17 niños en el país y más de 3.400 infectados

Ministerio de Salud

Gobierno de Chile

TODOS x CHILE!