Ministerio de Salud

Gobierno de Chile

Boletín de Vigilancia

Eventos de Salud Pública
SE 24 de 2017

(11 al 17 de junio)

Centro Nacional de Enlace
Departamento de Epidemiología
División de Planificación Sanitaria
Ministerio de Salud

Objetivo

Mantener un sistema de vigilancia basado en eventos de salud pública de interés nacional e internacional, que podrían llegar a tener un impacto en la salud de la población chilena.

Características

La información proveniente de fuentes formales es considerada como confiable y veraz. Cuando se trata de una fuente informal, la confiabilidad de la información no está establecida y/o se debe verificar.

Fuentes de Información

Fuentes de Información	Formales	Informales
	OMS	Comunidad
	OPS	Redes Sociales
	Ministerios Públicos	ONG
	Instituto de Salud Pública	Sector Privado
	SEREMI/ Servicios de Salud	Redes de Alerta
	Web de sitios oficiales	Medios de Comunicación

Tabla de Contenido

SE 24 de 2017

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional

- Influenza en Chile
- Campaña de Invierno
- Cierre de alerta alimentaria
- Hantavirus
- Caso de Malaria Importado en Arica
- Fragata Portuguesa

Eventos con potencial impacto para la salud pública
Noticias nacionales de salud pública

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (América)

- Brote de Conjuntivitis en las Américas
- Influenza en las Américas
- Sarampión/Rubeola en Las Américas
- Chikungunya

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (África)

- Brote de Ébola en República Democrática del Congo

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (Asia)

- Bote de Cólera en Yemen
- Poliovirus Salvaje
- Coronavirus MERS – CoV

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (Europa)

- Brote de Sarampión en Europa
- Brote de Hepatitis A en Europa

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional sin actualización

- Fiebre Amarilla
- Zika

Noticias internacionales de salud pública

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional

Influenza en Chile

SE 23 de 2017

Fuente: **Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud**

La notificación de ETI en la semana 23 (que termina el 10 de junio) alcanza a 22,4 por cien mil habitantes, manteniendo tendencia al alza y en valores cercanos al umbral de alerta. Se registra detección de influenza A en la mayoría de los centinelas con etiológico del país.

Las atenciones en las urgencias hospitalarias por ETI y neumonía mantiene tendencia al alza y se encuentran sobre el umbral de alerta en la SE 23.

En la vigilancia de las IRAG, información preliminar muestra aumento en la notificación de IRAG y tendencia al alza en detección de casos asociados a VRS e influenza A(H3N2).

El 9 de junio se envió el ORD 2005/MINSAL con las medidas para el refuerzo de la vigilancia epidemiológica y la aplicación de las medidas de prevención y control.

La vacunación contra la influenza en la población objetivo se realiza hasta el 16 de junio de 2017, priorizándose a las embarazadas (a partir de la 13° semana de gestación); niños/as entre 6 meses y 5 años; adultos mayores de 65 y más años y enfermos crónicos entre 6 y 64 años.

Vigilancia Centinela Enfermedad Tipo Influenza
Casos estudiados por Inmunofluorescencia. Chile 2017 (SE 23).



Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Dpto. Epidmeiología, DIPLAS-MINSAL, ISP.

Región	Semana 22		Semana 23	
	N° Casos	Tasa	N° Casos	Tasa
Arica-Paranicota	2	2,3	1	1,2
Tarapacá	12	19,0	19	30,1
Antofagasta	14	11,3	12	9,7
Atacama	3	11,5	10	38,4
Coquimbo	73	89,4	82	100,5
Valparaíso	32	11,9	18	6,7
Metropolitana	22	8,5	34	13,1
O'Higgins	5	11,4	5	11,4
Maule	29	18,7	31	20,0
Biobío	38	20,3	55	29,3
Araucanía	9	15,3	15	25,6
Los Ríos	26	54,0	20	41,6
Los Lagos	38	35,5	36	33,6
Aisén	2	7,7	2	7,7
Magallanes	3	9,2	11	33,7
País	308	19,6	351	22,4

Fuente: Vigilancia Centinela de ETI. Dpto. Epidemiología, DIPLAS/MINSAL
Tasa por cien mil habitantes en base a población inscrita

Campaña de Invierno

SE 24 de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

Me gusta 317 Compartir Tweet

15 de Junio de 2017

Ministerio de Salud decreta Alerta Sanitaria Preventiva por enfermedades respiratorias en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío

Santiago, 14 de junio de 2017.- El Ministerio de Salud decretó **Alerta Sanitaria Preventiva** por enfermedades respiratorias en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío. Esta herramienta permitirá sumar nuevos recursos y entregar mayor flexibilidad a la gestión que se realiza durante la **Campaña de Invierno**.

Cierre de Alerta Alimentaria

SE 24 de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

Me gusta 9 Compartir Tweet

16 de Junio de 2017

Ministerio de Salud cierra Alerta Alimentaria por productos lácteos

Santiago, 16 de junio 2017.- El Ministerio de Salud ordenó el cierre de la Alerta Alimentaria preventiva de dos productos lácteos en los que se halló la presencia de la bacteria *cronobacter sakazakii,* ordenándose la destrucción total de las unidades del lote afectado.

Se trató de los siguientes productos:

• PEDIASURE POLVO LOTE 1008584, ELABORADO 09/11/2015, CON VENCIMIENTO 29/10/2017, DE ABBOTT.

• LECHE PURITA CALO LOTE 176, ELABORADA 24/06/2016, CON VENCIMIENTO 24/06/2017 L-2 DE WATTS, FABRICADA EN COMUNA DE OSORNO.

Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)

SE 24 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, al 16 de junio de 2017

Se mantienen los **67 casos** de SCPH en el país, casi el doble de lo esperado según la mediana quinquenal (36 casos) y más del doble de lo observado en el año 2016 para el mismo período (33 casos).

Se han presentado **14 fallecidos (20,9% letalidad),** distribuidos en las regiones de Los Lagos (4), Biobío (3), Los Ríos (2), Araucanía (2), Maule (2), y no determinado (1).
El número de defunciones es igual al valor de la mediana quinquenal (14) y sobre lo observado el 2016 (7 fallecidos).

Perfil de los casos:

- 64,2% de sexo masculino (43).
- Mediana de edad 36 años (rango 3 y 83 años).
- Probable lugar de infección en las regiones de: Los Lagos (15), Biobío (14), Araucanía (10), Los Ríos (9), Maule (5), O'Higgins (3), RM (2), Aysén (1) y Valparaíso (1). Aún en estudio 7 casos.
- Actividad: trabajadores agrícolas (18), estudiantes (16), dueña de casa (8), trabajadores forestales (4), los otros 21 casos presentan otras actividades.
- Del total de casos hay 53 sobrevivientes, 48 han sido dados de alta, y 5 aún hospitalizados, en los siguientes establecimientos: Hospital de Concepción (1), Hospital Higueras (1), Clínica Alemana de Santiago (1), Hospital de Puerto Montt (1) y Clínica Alemana de Temuco (1).

Recomendaciones ante hallazgo de roedores silvestres

Ante varios hallazgos de roedores silvestres, domésticos y otros imposibles de identificar, en zonas semiurbanas de varias regiones del centro y sur del país, el Ministerio de Salud hace las siguientes recomendaciones:

Informar a la red asistencial esta situación, para que mantengan sospecha diagnóstica de enfermedades transmitidas por roedores (no sólo hanta)

Mantener y reforzar la comunicación de riesgo a la comunidad sobre conducta a seguir frente al hallazgo de roedores

Sobre los mensajes a la comunidad se sugiere:

- No manipular al roedor para intentar identificarlo, tomarle fotos, medirlo, etc.
- Con escoba y pala, o manipulándolos de manera indirecta, colocarlos en doble bolsa y eliminarlos a la basura o enterrarlos donde no exista recolección municipal .
- Desinfectar con solución de cloro los lugares contaminados.

Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)

SE 24 de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

Me gusta 0 Compartir Tweet

19 de Junio de 2017

Seremi de Salud Los Lagos continúa plan de acción Hanta Virus con jornada educativa en el Regimiento Sangra

En el Regimiento Sangra y con la presencia de más de 300 soldados, profesionales de las unidades de epidemiología y salud ambiental de la Seremi de Salud realizaron una charlan educativa, para así prevenir los contagios de virus hanta, acciones enmarcadas en el Plan de Acción de Hanta Virus, que lleva adelante la institución de salud.

Caso de Malaria importado en Arica

SE 24 de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

Me gusta 0 Compartir Tweet

13 de Junio de 2017

Internan a mujer en Hospital de Arica por caso de malaria asociado a viaje a zona endémica en el Perú

La SEREMI de Salud de Arica y Parinacota informó que hoy fue internada en el Hospital Doctor Juan Noé, una mujer por observación de malaria, quien se encuentra clínicamente estable, con las medidas y el tratamiento indicado para la enfermedad.

Fragata Portuguesa

SE 24 de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

El siguiente es el estado de las playas con prohibición de baño por presencia de fragata portuguesa, actualizado a las 15:00 horas del día lunes 19 de junio:

Región	Playa	Comuna
Antofagasta	La Rinconada (entre los sectores conocidos como Las Lozas y Rinconada)	Antofagasta
Araucanía	Playa de Boca Budi	Puerto Saavedra
Araucanía	Playa Maule	Puerto Saavedra
Los Lagos	Playa Rosaura	Ancud
Los Lagos	Playa Pargua	Calbuco
Los Lagos	Playa La Pasada	Maullín

Eventos con potencial impacto para la Salud Pública

Últimos sismos registrados

19 de junio de 2017

Fuente: Sismología

Fecha Local	Lugar	Magnitud
2017/06/19 10:55:51	23 km al NE de Camiña	4.5 Mw
2017/06/19 10:38:18	88 km al SE de Socaire	3.9 Ml
2017/06/19 07:54:36	45 km al N de Tocopilla	3.4 Ml
2017/06/19 05:29:42	60 km al S de Mina La Escondida.	3.7 Ml
2017/06/19 04:52:24	40 km al E de Pica	3.4 Ml
2017/06/19 03:21:42	82 km al SE de Socaire	4.1 Ml
2017/06/19 00:16:40	37 km al N de Camiña	3.1 Ml
2017/06/18 21:37:58	**9 km al N de Iquique**	**2.8 Ml**
2017/06/18 16:43:30	21 km al N de Andacollo	3.5 Ml
2017/06/18 14:04:40	**55 km al NO de La Higuera**	**3.6 Ml**
2017/06/18 08:21:38	32 km al NO de Ollagüe	3.0 Ml
2017/06/18 08:16:43	48 km al SO de Los Vilos	3.1 Ml
2017/06/18 07:44:19	22 km al O de Colina	3.0 Ml
2017/06/18 03:07:11	66 km al N de Calama	3.1 Ml
2017/06/18 02:21:25	4 km al E de Chañaral.	3.7 Ml

Monitoreo de actividad volcánica

19 de junio de 2017

Fuente: Sernageomín

ZONA NORTE

Guallatiri	
Irruputuncu	
Láscar	
Olca	
Parinacota	
San Pedro y San Pablo	
VER MAS	
Taapaca	
Isluga	
Ollagüe	
Lastarria	

ZONA CENTRO

Descabezado Grande y	
Planchón - Peteroa	
Tinguiririca	
San José	
Tatara - San Pedro	
Nevado de Longaví	
VER MAS	
Laguna del Maule	
Tupungatito	

ZONA SUR

Nevados de Chillán	
Copahue	
Antuco	
Calbuco	
Callaqui	
Chaitén	
VER MAS	
Corcovado y Yanteles	
Hudson	
Lanín	
Villarrica	
Llaima	
Lonquimay y Tolhuaca	
Mocho - Choshuenco	
Osorno	
Puyehue - Cordón Ca	
Quetrupillán	
Sollipulli	
Antillanca - Casabla	
Carrán-Los Venados	
Yate y Hornopirén	
Michinmahuida	
Melimoyu	
Macá y Cay	
Mentolat	
Huequi	

Radiación Ultravioleta

19 de junio de 2017

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

REGIÓN	RADIACIÓN UV
Arica y Parinacota	
Tarapacá	
Antofagasta	
Atacama	
Coquimbo	
Valparaíso	
Metropolitana	
O´Higgins	
Maule	

REGIÓN	RADIACIÓN UV
Biobío	
Araucanía	
Los Ríos	
Los Lagos	
Aysén	
Magallanes y Antártica	
Isla de Pascua	
Juan Fernández	
Antártica	

Nota: Este pronóstico tiene validez de tres días (a partir del 02 de septiembre) y solo aplica para una condición de día despejado

Alertas ONEMI

19 de junio de 2017

Fuente: ONEMI

18/06/2017 | 21:30 | Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Lib. Gral Bernardo O'Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos

Monitoreo por sistema frontal entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos

18/06/2017 | 19:21 | Araucanía

Se cancela Alerta Amarilla y declara Alerta Temprana Preventiva para la Región de La Araucanía por sistema frontal

18/06/2017 | 13:18 | Aysén del Gral Carlos Ibáñez del Campo

Se actualiza Alerta Temprana Preventiva para la Región de Aysén por nevadas

16/06/2017 | 19:28 | Lib. Gral Bernardo O'Higgins

Se cancela la Alerta Temprana Preventiva y declara Alerta Amarilla para la Región de O'Higgins por sistema frontal

16/06/2017 | 18:05 | Valparaíso

Se declara Alerta Amarilla para la comuna de Juan Fernández por sistema frontal

16/06/2017 | 17:28 | Araucanía

Se declara Alerta Roja para la comuna de Temuco por aumento de caudal

16/06/2017 | 17:05 | Biobío

Se actualiza Alerta Amarilla para la Región del Biobío por sistema frontal

Noticias Nacionales

Noticias nacionales

19 de junio de 2017

Fuente: Adnradio.cl; 24horas.cl; Biobiochile.cl; Elnavegable.cl

Antofagasta

Confirman brote de Hepatitis A en Antofagasta por comida callejera

Hasta el momento, existen 74 personas afectadas por la enfermedad.

Decretan alerta temprana preventiva en Antofagasta por presencia de fragata portuguesa

15 JUNIO 2017

POR 24HORAS.CL TVN

La medida prohíbe el baño en el sector Rinconada más el área comprendida entre las playas Las Locas y Rinconada.

Twittear | Compartir | 0 | Compartir 0

Tarapacá

Investigan brotes de sarna en comuna de Alto Hospicio: se han registrado 40 casos

Los Ríos

Detectan presencia de fragata portuguesa en costas de la región de Los Ríos

La autoridad sanitaria llamó a la prevención, especialmente a las personas que recolectan algas y cochayuyo.

Por El Naveghable

177 Lecturas

14 de Junio, 2017 16:0

Comenta

Ejemplares de fragata portuguesa fueron halladas en la playa de Calfuco en la región de Los Ríos por funcionarios de la seremi de Salud y Sernapesca, quienes detallaron que encontraron especies pequeñas, pero adheridas a cochayuyos y algas.

Noticias nacionales

19 de junio de 2017

Fuente: Detoque.net; Latercera.com

Coquimbo

Masiva intoxicación de pasajeros en bus interurbano

15 junio, 2017 Frank Negocios 0

A eso de las 03:30 hrs. de hoy, se dio cuenta de la intoxicación de pasajeros a bordo del bus interurbano PlussChile, el cual mantenía trayecto desde la ciudad de Calama hasta Santiago.

Según la información entregada, en la ciudad de Copiapó la empresa otorgó alimentos consistentes en una ración de fideos con carne de cerdo la cual por versiones propias de los pasajeros, se habría encontrado fría y por tal motivo 15 de ellos se habrían enfermado del estómago.

Coquimbo presenta las tasas más altas de influenza a nivel país

Autor: L. Leiva, D. Aguayo y P. Barría

Contagios son cinco veces más altos que el promedio nacional. Mujer de 89 años falleció en urgencia de Hospital de P. Montt.

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional

- América

Brote de Conjuntivitis en las Américas

SE 23 del año 2017

Fuente: OPS

Hasta la semana epidemiológica (SE) 23 de 2017, cinco países y territorios de las Américas han notificado brotes de conjuntivitis: las Bahamas, Brasil, Guadalupe, Martinica, y la República Dominicana.

Bahamas: Durante los meses de mayo y junio de 2017, se observó un incremento en el número de casos de conjuntivitis. Un total de 240 casos fueron notificados, en comparación con 187 casos notificados durante el mismo período en 2016. Las medidas de salud pública han sido implementadas por las autoridades de salud.

Brasil: En el municipio de Humaitá, Estado Amazonas, se notificó un brote de conjuntivitis con 172 casos notificados entre el 18 de mayo y el 6 de junio de 2017. Las autoridades locales de salud se encuentran implementando las medidas de prevención y control para detener el brote.

Guadalupe: Desde finales de 2016 se observó un aumento del número de casos de conjuntivitis por encima del umbral epidémico. Entre las SE 20 y SE 21 de 2017, se han registrado entre 500 y 600 casos semanales notificados y una incidencia acumulada de 20 casos por 10.000 habitantes (cifra ocho veces superior a lo esperado para esta época del año). Las pruebas de laboratorio realizadas a una fracción de muestras de los casos sospechosos resultaron positivas para enterovirus.

Martinica: El número de casos de conjuntivitis aumentó significativamente en la SE 20 de 2017, cuando se notificaron 250 casos sospechosos semanales. La incidencia acumulada de conjuntivitis entre la SE 20 y la SE 21 fue de 10 casos por 10.000 habitantes.

Las comunas de Marín y François informaron las tasas de incidencia más altas con 41 y 35 casos por 10.000 habitantes, respectivamente.

República Dominicana: Hasta la SE 21 de 2017, se notificaron 66.626 casos de conjuntivitis, cifra que representa un aumento de 62% en comparación con el mismo período del año anterior (41.022 casos notificados). El brote epidémico de conjuntivitis se inició en la SE 18 de 2017 y sigue en curso.

Recomendaciones

Ante el aumento de la transmisión de conjuntivitis en algunos países y territorios de la Región, la OPS / OMS enfatiza en la necesidad de reforzar la vigilancia e implementar las recomendaciones que contribuyen a controlar la diseminación de la enfermedad.

Fuente: OPS

Influenza en las Américas

SE 22 del año 2017

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza y de otros virus respiratorios ha disminuido en América del Norte. La Influenza B continuó predominando en la región, pero con detecciones bajas reportadas. En México, se ha reportado contados casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) positivos para influenza y la actividad permanece a niveles inter-estacionales.

Caribe: Se ha notificado baja actividad de influenza y otros virus respiratorios en la mayor parte de la sub-región. En Cuba y en Jamaica, la actividad permaneció similar a los niveles observados en las temporadas anteriores.

América Central: La mayoría de los indicadores epidemiológicos se mantienen bajos o en disminución, y se ha reportado actividad baja de influenza. En Guatemala, la actividad de influenza aumentó ligeramente en semanas recientes.

Sub-región Andina: En general, la actividad de influenza y otros virus respiratorios permaneció baja. La actividad elevada de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) continuó en Colombia. En Bolivia, se notificó mayor actividad de influenza, con co-circulación de influenza A(H3N2) y B.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VRS reflejaron una tendencia al aumento, a niveles estacionales, en toda la subregión. En Brasil, los casos acumulados de IRAG y fallecidos durante la SE 22 fueron mayores a los niveles en 2015-2016; y la mayoría de los casos de IRAG se reportaron en la región suroeste. En Argentina, Chile y Paraguay la actividad de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) y de IRAG se incrementó, con predominio de influenza A(H3N2) en semanas recientes.

Nivel Global: En la zona templada del hemisferio sur, la actividad de influenza empezó a aumentar lentamente, pero permaneció baja en general. La actividad de influenza en la zona templada del hemisferio norte continuó disminuyendo. En todo el mundo, predominó el virus influenza B.

Sarampión/Rubeola: OPS

SE 23 del año 2017

Fuente: OPS

Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Oficina Regional para las Américas

Inmunización Integral de la Familia/Familia, Género y Curso de Vida

Vigilancia del sarampión y de la rubéola en las Américas

Vol. 23, No.23

Semana que termina el 10 de junio el 2017

Casos confirmados de sarampión en Estados Unidos, 2017*

Desde el 1 de enero hasta el 9 de junio del 2017, un total de 100 casos de sarampión fueron confirmados en 12 estados de los Estados Unidos. Actualmente, el estado de Minnesota reporta el brote más grande, con un total de 68 casos confirmados. La edad de los casos oscila entre 10 meses y 17 años de edad, incluyendo 3 adultos. La fuente de infección es desconocida y el genotipo identificado es el B3.



Fuente: Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
* Datos hasta el 9 de junio del 2017

Sarampión/Rubeola: OPS

SE 23 del año 2017

Fuente: OPS

Clasificación de casos sospechosos de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita (SRC) para el período entre las semanas 01-23, 2017

Subregión y país		Casos sospechosos 2017	Sarampión confirmado 2017			Año/Sem. último caso conf. de sarampión	Rubéola confirmado 2017			Año/Sem. último caso conf. de rubéola	Diagnóstico de casos descartados 2017		Síndrome de Rubéola Congénita			Año/Sem. último caso conf. de SRC
			Clin.	Lab.	Total		Clin.	Lab.	Total		Dengue	Otros	Sosp.	Conf.	IRC*	
AND	BOL	26	0	0	0	2000-40	0	0	0	2006-03	0	24	0	0	0	…
	COL	386	0	0	0	2015-35	0	0	0	2012-31	0	378	193	0	0	2005/34
	ECU	136	…	…	…	2016-14	…	…	…	2004-49	0	116	0	…	…	2004/49
	PER	139	0	0	0	2015-25	0	0	0	2009-04	2	117	0	0	0	2007/16
	VEN	183	0	0	0	2012-17	0	0	0	2015-52	1	182	33	0	0	…
BRA	BRA	580	0	0	0	2015-32	0	0	0	2014-40	0	492	17	0	0	2009/34
CAP	CRI	5	0	0	0	2014-09	0	0	0	2001-39	0	4	60	0	0	…
	GTM	51	0	0	0	1998-05	0	0	0	2006-31	0	51	2	0	0	2005/00
	HND	51	0	0	0	1998-16	0	0	0	2004-11	0	47	8	0	0	2001/00
	NIC	46	0	0	0	1994/14	0	0	0	2004-19	0	41	24	0	0	2005/00
	PAN	24	0	0	0	2011-20	0	0	0	2002-48	0	18	0	0	0	…
	SLV	85	0	0	0	2001-19	0	0	0	2006-30	0	73	0	0	0	2001/00
CAR	CAR	93	0	0	0	2011/48	0	0	0	2008/18	0	88	51	0	0	1999/00
LAC	CUB	284	0	0	0	1993/27	0	0	0	2004/06	0	284	0	0	0	…
	DOM	19	0	0	0	2011-18	0	0	0	2007-45	0	16	0	0	0	…
	HTI	55	0	0	0	2001-39	0	0	0	2006-21	0	44	10	0	0	…
MEX	MEX	1436	0	0	0	2015-02	0	0	0	2001-25	0	1150	0	0	0	…
NOA	CAN	…	…	43	43[a]	2017/21	0	0	0	2016/06	…	…	…	…	…	2015/50
	USA	…	…	100	100[a]	2017/20	…	1	1	2017/20	…	…	…	…	…	2015/00
SOC	ARG	135	0	3	3	2017-17	0	0	0	2014-22	0	81	60	0	0	2009/27
	CHL	73	0	0	0	2015-27	0	0	0	2011-25	0	69	53	0	0	…
	PRY	247	0	0	0	1998-44	0	0	0	2005-21	1	241	0	0	0	2003/06
	URY	0	0	0	0	1999/08	0	0	0	2001/37	0	0	0	0	0	…
TOTAL		**4054**	**0**	**146**	**146**	**--**	**0**	**1**	**1**	**--**	**4**	**3516**	**511**	**0**	**0**	**--**

*Infección de rubéola congénita; (a) Datos provisionales. …No se recibió informe

- Hasta la Semana Epidemiológica 23 de 2017, la cifra de casos confirmados de sarampión en las Américas aumentó a 146: Canadá 43, Estados Unidos 100 y Argentina 3 casos.
- Hasta la misma SE, Chile ha reportado 73 casos sospechosos de sarampión.
- En la SE 23 no se notificaron nuevos casos de Rubeola en las Américas.

Chikungunya: OPS

SE 24 de 2017

Fuente: OPS

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las Américas, por territorio, SE 24 de 2017.

Subregión	Total casos confirmados autóctonos	Total casos confirmados importados	Total fallecidos
América del Norte	15	10	0
América Central	16	1	0
Caribe Latino	56	0	0
Región Andina	464	0	0
Cono Sur	28.229	2	13
Caribe no Latino	0	0	0
Total	28.780	13	13

Tasa de incidencia: 8,73

(autóctonos sospechosos + autóctonos confirmados) / 100.000 hab.

Casos importados en Chile, año 2017

Brasil (1)

Resumen

- Hasta la Semana Epidemiológica 24, se habían reportado en las Américas, 28.780 casos, con 13 fallecidos asociados a Chikungunya.

- Todos los decesos se han reportado en Brasil.
- Para ver los detalles por país, acceda al siguiente link: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=343&Itemid=40931&lang=es

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional

- África

Brote de Ébola en República Democrática del Congo

SE 24 del año 2017

Fuente: OMS

Al 12 de junio se han reportado 33 alertas, de las cuales solo una de ellas cumple con la definición de caso sospechoso. Para este caso se ha tomado una muestra de sangre, la cual está siendo procesada actualmente.

Reporte Actual:

- 5 casos confirmados
- Tres casos probables
- 1 casos sospechoso
- 4 fallecidos
- 50% letalidad

En tanto, continúan trabajando los siete comités de respuesta a nivel nacional:

- Supervisión
- Gestión de casos
- Saneamiento e higiene del agua (WASH) y Bioseguridad,
- Laboratorios e investigación
- Gestión Psicosocial
- Logística
- Comunicación.

Cabe destacar que el área afectada es remota y difícil de alcanzar, con una comunicación y transporte limitados.

Distribución geográfica de los casos de Ébola, República Democrática del Congo. 12 de junio de 2017.



Eventos de Salud Pública de Interés Internacional

- Asia

Brote de Cólera en Yemen

SE 24 de 2017

Fuente: OMS

El número de casos sospechosos de cólera en Yemen continúa aumentando, llegando a 101.820 con 791 muertes, al 7 de junio de 2017. Los más afectados son los más vulnerables del país: los niños menores de 15 años (46% de los casos) y los mayores 60 años (33% de las muertes).

La OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) están trabajando en las áreas que reportan el mayor número de casos, para detener la propagación de la enfermedad.

“Estos puntos calientes son la fuente de gran parte de la transmisión del cólera en el país", dijo el Dr. Nevio Zagaria, jefe de la oficina de la OMS en Yemen.

Por su parte, el Dr. Meritxell Relano, Representante de UNICEF en Yemen, dijo que “el brote de cólera está empeorando drásticamente la situación de los niños. Muchos de los niños que han muerto de la enfermedad también estaban agudamente desnutridos", y añadió: "Hoy en día, la vida de los niños en Yemen es una lucha desesperada por la supervivencia, con el cólera, la desnutrición y la incesante violencia está constantemente sonando como un latigazo en sus puertas".

Aproximadamente 3,5 millones de personas en todo el país se han alcanzado mediante la desinfección de las estaciones de servicio de los tanques de agua, la cloración del agua potable, la restauración de las plantas de tratamiento de agua, la rehabilitación de los sistemas de suministro de agua y la distribución de kits de higiene. La UNICEF y la OMS están prestando apoyo y suministros médicos a los Centros de Rehidratación Oral ya los centros de tratamiento diarreico en todo el país donde los pacientes son examinados y reciben asistencia médica inmediata. Todo esto se hace junto con la difusión de la conciencia de higiene a las poblaciones afectadas.

Fuente: OMS

Poliovirus Salvaje

SE 24 de 2017

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Casos poliovirus salvaje tipo 1:



Países	Casos derivados de la vacuna, 2017	Casos derivados de la vacuna, 2016
Afganistán	0	0
Pakistán	0	0
Guinea	0	0
RPD Lao	0	3
Madagascar	0	0
Myanmar	0	0
Nigeria	0	0
RDC	4	0
República Árabe Siria	2	0
Total	6	3

Resumen:

- En la SE 24 del año 2017, Afganistán reportó un nuevo caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1). El caso tuvo el inicio de la parálisis el 16 de abril y corresponde al distrito de Nawzad, Hilmand.
- El virus se aisló en un contacto familiar sano de un caso. Con esto el número total de casos de WPV1 para 2017 sube a cuatro en este país y es el caso más reciente de este año.
- No se han registrado nuevos casos en Siria.
- No se han notificado casos derivados de la vacuna en otros países.

Coronavirus MERS-CoV

SE 24 de 2017

Fuentes: OMS

Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV)

Arabia Saudita: Entre el 11 y el 15 de junio de 2017, el punto focal nacional del RSI de Arabia Saudita, informó de 14 casos nuevos de infección por Coronavirus del Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV), incluyendo un caso mortal entre los casos notificados anteriormente.

Hasta la fecha se han identificado 3 cluster y siete de los nuevos casos notificados son trabajadores de la salud.

Clúster 1: Este grupo está actualmente en un hospital, ciudad de Riyadh, región de Riyadh. Se han notificado otros nueve casos en este grupo, incluidos tres trabajadores de la salud. En total, 32 casos confirmados por laboratorio notificados a la OMS están asociados con este grupo hasta la fecha. Todos los casos asintomáticos están en aislamiento en el hogar y todos los casos sintomáticos están aislados en un hospital.

Clúster 2: No hay nuevos casos que estén asociados con el grupo 2, desde el último informe del brote publicado el 13 de junio de 2017.

Clúster 3: Este grupo se encuentra en un tercer hospital en la ciudad de Riyadh, en la región de Riyadh. Además de los casos notificados anteriormente, el grupo comprende cuatro casos recientemente notificados. Hasta la fecha, este grupo incluye ocho pacientes confirmados por laboratorio, todos ellos trabajadores de la salud.

A nivel mundial, desde septiembre del año 2012 y hasta la fecha, la OMS ha sido notificada de 2.029 casos confirmados por laboratorio de infección con MERS-CoV, incluyendo al menos 704 muertes relacionadas.

Evaluación de riesgos de la OMS

MERS-CoV causa infecciones humanas graves que resultan en una alta letalidad y ha demostrado la capacidad de transmitirse entre los seres humanos.

Hasta el momento, la transmisión observada de humano a humano se ha producido principalmente en entornos de atención de salud.

La notificación de casos nuevos no modifica la evaluación general del riesgo.

La OMS espera que se sigan informando casos adicionales de MERS-CoV en el Oriente Medio y que los casos continúen siendo exportados a otros países por personas que podrían adquirir la infección después de la exposición a animales o productos de origen animal (por ejemplo, Dromedarios) o la fuente humana (por ejemplo, en un establecimiento de atención médica).

La OMS sigue vigilando la situación epidemiológica y la evaluación del riesgo está basada en la información más reciente disponible.

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional

- Europa

Brote de Sarampión en Europa

SE 24 de 2017
Fuente: ECDC

Bulgaria: Desde mediados de marzo de 2017 y hasta el 11 de junio, Bulgaria ha notificado 130 casos en Plovdiv. También informó de casos en Pazardzhik (10) y en Montana (4).

República Checa: A partir del 1 de junio de 2017, la región de Moravia-Silesia informó de 126 casos de sarampión, de los cuales 119 fueron confirmados por laboratorio.

Alemania: Desde comienzos del año 2017 y hasta el 7 de junio, Alemania ha reportado 698 casos. Se trata de un aumento de 30 casos desde la actualización anterior. En el mismo período de 2016, Alemania había notificado 82 casos.

Italia: Desde comienzos de 2017 y hasta el 11 de junio, Italia ha notificado 2.988 casos en 18 de las 21 regiones. Entre ellos, 237 son trabajadores de la salud. La mediana de edad es de 27 años, el 89% de los casos no fueron vacunados y el 6% recibió solo una dosis de vacuna.

Rumania: Entre el 1 de enero de 2016 y el 9 de junio de 2017, Rumania ha notificado 6.743 casos, incluidos 30 muertos. Los casos han sido confirmados por laboratorio o tienen vínculo epidemiológico con un caso confirmado. Los lactantes y los niños pequeños son los más afectados. Cuarenta y uno de los 42 distritos han denunciado casos, Timis (parte oeste del país en la frontera con Serbia) es el Distrito más afectado con 1.072 casos.

Nuevos casos de sarampión semana 1 de 2008 a semana 23 de 2017, Rumania



Brote de Hepatitis A en Europa

SE 24 de 2017

Fuente: ECDC

Entre el 1 de junio de 2016 y el 12 de junio de 2017, 15 países han notificado 1.173 casos: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido.

Las investigaciones de estos eventos han identificado tres clusters separados, basados en la secuenciación genética del Virus de la hepatitis A (VHA).

Por otra parte, se han identificado brotes adicionales de hepatitis A en los Estados miembros de la UE que afectan a HSH:

- Los Países Bajos informaron un caso de VHA de otra cepa (RIVM-HAV-16-069) en un HSH. Esta cepa sólo se identificó antes en el Reino Unido (un caso) e Italia (un caso).
- Entre julio de 2016 y el 2 de abril de 2017, el Reino Unido notificó 266 casos pertenecientes a los tres cluster mencionados anteriormente. La mayoría de los casos (74%) se encontró en HSH y estuvieron agrupados geográficamente (63%) en Londres.
- Entre el 1 de enero y el 11 de junio de 2017, Portugal notificó 327 casos de VHA, de los cuales el 91% son hombres y el 78% son de Lisboa y Vale do Tejo.
- La infección por transmisión sexual fue indicada por el 54% de los casos.
- La vacuna contra la hepatitis A es Recomendado a las personas en riesgo.

Las redes sexuales altamente interconectadas entre hombres que tienen sexo con hombres (HSH) en Europa, pueden contribuir a la dimensión multinacional de estos Clusters.

En al menos dos Estados miembros de la UE / EEE, el Reino Unido y Alemania, los casos secundarios se han vinculado a casos índice.

La circulación de tres diferentes virus de Hepatitis A, genotipo IA, en la población de HSH, es probable que sea el resultado de varias introducciones en estas redes.

La transmisión adicional resultante de estos conglomerados puede prevenirse mediante la vacunación de HSH y la profilaxis post exposición en los contactos de casos. Sin embargo, la disponibilidad limitada de vacunas en algunos países puede tener un impacto en la implementación de esta medida de control.

Además, dado que muchos de los contactos del grupo de riesgo son anónimos, su oportuna vacunación es un desafío.

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional

- Sin actualización

Fiebre Amarilla en las Américas

SE 21 de 2017

Fuente: OPS

Desde la semana epidemiológica (SE) 1 y hasta la SE 19 de 2017, Brasil, Colombia, Ecuador, el Estado Plurinacional de Bolivia, Perú y Suriname, han notificado casos sospechosos y confirmados de fiebre amarilla.

Brasil: desde el inicio del brote en diciembre de 2016 y hasta el 18 de mayo de 2017, se notificaron 3.192 casos sospechosos de fiebre amarilla (758 confirmados, 1.812 descartados, y 622 quedan en investigación), incluidas 426 defunciones (264 confirmadas, 120 descartadas, y 42 en investigación).

La tasa de letalidad entre los casos confirmados es de 34%. De acuerdo al sitio probable de infección, los casos notificados se registran en 398 municipios, mientras que los casos confirmados se circunscriben a 131 municipios de 7 estados (Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo y Tocantins).

Con relación a las defunciones confirmadas según sitio probable de infección, 80 corresponden a Espírito Santo, 1 Goiás, 164 a Minas Gerais, 4 a Pará, 5 a Rio de Janeiro y 10 a São Paulo.

En los estados con más de 5 defunciones confirmadas, la tasa de letalidad entre los casos confirmados es de 50% en São Paulo, 35% en Rio de Janeiro, 34% en Minas Gerais y Espírito Santo. En Espirito Santo (ES), Minas Gerais (MG), y São Paulo (SP) no se han confirmado casos en nuevos municipios en las dos últimas semanas y la fecha de inicio de síntomas de los casos confirmados más recientes son: 14 de marzo de 2017 (MG), 19 de abril (SP), y 24 de abril (ES).

Distribución de casos notificados de fiebre amarilla, según fecha de inicio de síntomas y estado probable de infección. Brasil 1 de diciembre 2016 al 18 de mayo de 2017.



MG: Minas Gerais, SP: São Paulo, ES: Espírito Santo, RJ: Rio de Janeiro.

Virus Zika en Las Américas

SE 21 de 2017

Fuente: OPS

Se mantiene en 48 el número de países y territorios de las Américas que han confirmado casos autóctonos por transmisión vectorial de Zika y en cinco el número de países que notificaron casos de Zika transmitidos sexualmente. Desde la semana epidemiológica (SE) 44 de 2016, ningún nuevo país/territorio de las Américas ha confirmado transmisión autóctona vectorial.

América del Norte: En Estados Unidos, el Departamento de Salud de Florida informó que el estado no tiene actualmente áreas identificadas con transmisión activa de Zika, y no se han vuelto a registrar casos de transmisión local. El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas no ha notificado casos de transmisión local durante el 2017. Por su parte, México continúa notificando casos confirmados, aunque con tendencia decreciente desde la Semana Epidemiológica (SE) 40 de 2016. Desde la última actualización epidemiológica, no se ha confirmado circulación del virus Zika en nuevos estados.

América Central: La tendencia de casos notificados en la sub región sigue decreciente, con excepción de Belice, donde se observó un aumento en el número de casos sospechosos y confirmados entre la SE 49 de 2016 y 7 de 2017. La mayoría de los casos confirmados provienen del distrito de Corozal. Desde la SE 10 a la SE 14 de 2017, en esta sub región se notificaron en promedio 71 casos sospechosos y confirmados semanalmente.

Caribe: En Turcos y Caicos se observó un aumento en el número de casos sospechosos entre la SE 4 y SE 8 de 2017. En los demás países/territorios de esta subregión continúa la tendencia decreciente de casos notificados, con un promedio semanal de 330 casos sospechosos y confirmados entre la SE 10 y SE 14 de 2017.

América del Sur: Desde la SE 1 de 2017 se observa una tendencia creciente de casos sospechosos y confirmados notificados en esta sub región, a expensas del aumento registrado en Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Ecuador y Perú. Entre la SE 10 y 14 de 2017, en promedio se registraron 1.246 casos sospechosos y confirmados semanales en la sub región. En Argentina, se observó un aumento de casos sospechosos y confirmados entre las SE 1 y 16 de 2017; dicho aumento está relacionado al brote en las provincias de Formosa, Salta y Chaco10. En estas dos últimas provincias la fecha de inicio de síntomas de los últimos casos confirmados registrados fue la SE 16 de 2017.

Noticias Internacionales

Noticias Internacionales: América

19 de Junio de 2017

Fuente: Noticiasya.com; Peru21.pe

Estados Unidos

Reportan alarmante brote de hepatitis A en San Diego

Autoridades de salud reportaron que ya se han registrado cuatro muertes en la región por este padecimiento.

Perú

Neumonía ya ha cobrado la vida de 97 niños menores de 5 años en el Perú

Jueves 15 de junio del 2017 | 13:09

En ese mismo tiempo se han registrado más de un millón de casos de infecciones respiratorias agudas.

Noticias Internacionales: África

19 de junio de 2017

Fuente: Europapress.es

Nigeria

Nigeria se enfrenta a un fuerte brote de meningitis C sin vacunas suficientes

Últimas noticias / Intern

Identificado el autor
contra un grupo de c
republicanos en un c
de Virginia

Noticias Internacionales: Asia

19 de Junio de 2017

Fuente: Correodelsur.com; Sputnik.com; Prensa-latina.cu

Yemen

Asciende a 1.054 el número de muertos por cólera en Yemen

17 JUNIO 2017, 18:46 | AGENCIAS TAMAÑO DE TEXTO: A+ A-

1677 veces leída

Mundo

Imprimir nota

Yemen, muertos, cólera, enfermos

187 Me gusta

1 G+1

187 Compartir

Siria

India

Más de 11 mil casos de dengue y siete mil de chikungunya en India

Nueva Delhi, 13 jun (PL) Más de 11 mil 400 casos de dengue y siete mil 700 de chikungunya se reportan en la India en lo que va de año, una cifra que aumentará drásticamente tras el monzón, informaron hoy fuentes del sector.

Con cuatro mil 735 contagiados, el suroccidental estado de Kerala es el más golpeado por el dengue, seguido por el vecino Tamil Tadu con tres mil 259, precisa la página web del Programa Nacional de Enfermedades Transmitidas por Vectores del ministerio de Salud indio.

Noticias Internacionales: Europa

19 de Junio de 2017

Fuente: Vacunasaep.org

Portugal

BROTE DE SARAMPIÓN EN PORTUGAL TRAS MÁS DE 12 AÑOS SIN CASOS

14 junio 2017

Versión para imprimir | Compartir | Twittear

Fuente: Eurosurveillance

Casos confirmados de sarampión por grupo de edad. Portugal, 23 de febrero - 31 de mayo de 2017.



Ministerio de Salud

Gobierno de Chile

TODOS x CHILE!