



Departamento
de Epidemiología

Ministerio de Salud

Gobierno de Chile


Boletín Epidemiológico Trimestral Enero a Junio de 2015

Resumen Ejecutivo

El Boletín epidemiológico Trimestral, es un documento generado en el Dpto. de Epidemiología de la División de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud de Chile. Tiene como objetivo presentar, la situación epidemiológica de algunas enfermedades establecidas como de notificación obligatoria (ENO) en el [Decreto Supremo 158](#) y sus modificaciones.

En cada uno de los informes que se presentan a continuación, el lector encontrará un análisis descriptivo actualizado con los datos provisorios y acumulados durante el primer semestre del año 2015 de algunas ENO. Como fuentes de datos, se usaron las bases del Departamento de Estadísticas de Salud (DEIS), las del Departamento de Epidemiología y las de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Plaguicidas del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL).

En este resumen, se presentan los riesgos más altos de contraer algunas de las ENO analizadas, según distribución geográfica. Las regiones se han agrupado entre las que ocupan los tres primeros lugares, de acuerdo al valor de su tasa de incidencia; las que no fueron ajustadas para construir el ranking.



Región de Arica y Parinacota: ocupó el tercer lugar entre las tres primeras regiones con tasa de incidencia más alta de **Intoxicaciones agudas por plaguicidas**; superando a la del país en 2,8 veces.

Región de Tarapacá: ocupó el primer lugar entre las regiones con mayor riesgo para **Sífilis y Gonorrea**; el tercer lugar para **Hepatitis A y Enfermedad Meningocócica**; este último lo compartió con la región de Atacama.

Región de Antofagasta: es la región que concentró la mayor cantidad de problemas de salud. Ocupó el primer lugar en las tasas de incidencia de **diarrea en < 5 años de edad** y el segundo lugar en **Hepatitis A**; situación que podría estar dando cuenta de un deterioro en las condiciones de saneamiento básico y de higiene personal. También se posicionó en el primer lugar con las tasas de incidencia de **intoxicaciones agudas por plaguicidas y de enfermedad meningocócica** y el segundo lugar en **Gonorrea**.

Región de Atacama: a pesar de haber sido afectada por un desastre natural hacia fines de marzo, lo que podría haber provocado un aumento en los riesgos para varias enfermedades, durante el primer semestre, compartió el tercer lugar con Tarapacá en cuanto al riesgo de contraer **Enfermedad Meningocócica** y el mismo lugar para contraer **Coqueluche**.

Región de Coquimbo: se observó un riesgo alto para **Enfermedad Meningocócica**, ocupando el segundo lugar a nivel nacional, junto con la región de Valparaíso.

Región de Valparaíso: compartió con Antofagasta el primer lugar entre las regiones con mayor riesgo (0,5 por cien mil habs.) para **Enfermedad Meningocócica**. Por otra parte, en **Sífilis**, ocupó el tercer lugar.

Región Metropolitana: con relación a los riesgos para contraer enfermedades, compartió con la de Coquimbo el segundo lugar para **Enfermedad Meningocócica**.

Región del Libertador Bdo. O'Higgins: se posicionó en el segundo lugar para **Fiebre Tifoidea y paratifoidea**; para **Intoxicaciones agudas por plaguicidas** y entre las regiones con menor tasa de notificación de casos sospechosos de **sarampión/rubeola**.

Región del Maule: no estuvo en ninguno de los tres primeros lugares para los problemas de salud analizados en este Informe. Lo cual, no significa que no presente riesgos para otros problemas de salud.

Región del Biobío: presentó la tasa más alta de **Hepatitis A**; con un valor muy por encima del resto de las regiones y ocupó el segundo lugar en **Fiebre Tifoidea y paratifoidea**; ambas enfermedades entéricas, lo que podría estar revelando un deterioro de las condiciones de saneamiento básico, en el consumo de alimentos seguros y la mantención de la higiene personal por parte de la población.

Región de La Araucanía: compartió el tercer lugar con la región de O'Higgins entre las tres regiones con mayor incidencia para **Fiebre Tifoidea y paratifoidea**. Aunque para las otras entéricas no se encuentra entre las de más alto riesgo, el número de casos observados de **Hepatitis A**, supera a lo esperado.

Región de Los Ríos: ocupó el segundo lugar en riesgo para contraer **Coqueluche**.

Región Los Lagos: ocupó el primer lugar en riesgo para **Coqueluche** y el tercer lugar con relación al riesgo de contraer **Gonorrea**.

Región de Aisén: ocupó el tercer lugar entre las regiones con tasa más baja de notificación de casos sospechosos de **sarampión/rubeola**.

Región de Magallanes: presentó la tasa más alta de incidencia de **Fiebre Tifoidea y paratifoidea** (n= 2 casos) y el tercer lugar en riesgo para **diarrea en < 5 años de edad**; con relación a **Sífilis**, ocupó el segundo lugar a nivel nacional.

