


BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE DE 2015 - DPTO. DE EPIDEMIOLOGÍA



| | |
|--------------------|--|
| Arica y Parinacota | Presentó la segunda tasa más alta de notificación de sarampión-rubéola, lo que indica una mejora en la vigilancia integrada de esas enfermedades. |
| Tarapacá | Ocupó el primer lugar en los riesgos para infecciones de transmisión sexual (ITS), con incidencias por cien mil hab. de 27,3 para sífilis y de 29,7 para gonorrea. |
| Antofagasta | Presentó el segundo lugar en el riesgo por cien mil hab. para hepatitis A y hepatitis viral sin especificación (10,9). Mientras que para las ITS, gonorrea y sífilis, se posicionó en el segundo y el tercer lugar respectivamente, con tasas de incidencia de 24,9 y 22,3. |
| Atacama | Se posicionó en el tercer lugar en riesgo para coqueluche, con una tasa de incidencia de 3,5 por cien mil hab. Con relación a hepatitis A y hepatitis viral sin especificación, presentó un número de casos levemente superior a lo esperado (9 versus 6). |
| Coquimbo | Tuvo el tercer lugar entre las tres regiones con la tasa de notificación más alta de sarampión-rubéola, lo que indica una mejora en la vigilancia integrada de esas enfermedades. |
| Valparaíso | Ocupó el primer lugar en el riesgo para enfermedad meningocócica, con una tasa de incidencia de 1,1 por cien mil hab. (tasa del país=0,5 por cien mil hab.) |
| Metropolitana | Esta región agrupa 40,6% del total de la población de Chile. Se posicionó en el segundo lugar en el riesgo por cien mil hab. para contraer en enfermedad meningocócica, con una incidencia de 0,7. Presentó un brote de sarampión, con un total de 9 casos. |
| Libertador | Entre las regiones que presentaron tasas más bajas de notificación de casos sospechosos de sarampión-rubéola, ocupó el segundo lugar (1,2 por cien mil hab.). Mientras que compartió el segundo lugar con la región de la Araucanía en el riesgo de contraer fiebre tifoidea y paratifoidea (0,4 por cien mil hab.). |
| Maule | Si bien es cierto mantiene un riesgo bajo (1,9 por cien mil hab.) para hepatitis A y hepatitis viral sin especificación, el número de casos acumulados a la SE 39 es el doble de lo esperado (20 versus 10). |
| Biobío | Se caracterizó porque presentó los riesgos más altos para enfermedades entéricas, ocupando el primer lugar tanto para fiebre tifoidea y paratifoidea, como para hepatitis A y hepatitis viral sin especificación, con incidencias de 1,5 y 44,9 por cien mil hab., respectivamente. |
| Araucanía | Con respecto a fiebre tifoidea y paratifoidea, compartió el segundo lugar con la región del Libertador con un riesgo de 0,4 por cien mil hab. Al mismo tiempo, para otra enfermedad entérica (hepatitis A y hepatitis viral sin especificación) presentó un número de casos superior a lo esperado (17 versus 10). |
| Los Ríos | Entre las tres regiones con riesgo más alto para contraer enfermedad meningocócica, se posicionó en segundo lugar con una incidencia de 0,7 por cien mil hab. (tasa país=0,5). |
| Los Lagos | Ocupó el segundo lugar en el riesgo para contraer coqueluche (7,3 por cien mil hab.), superando a la tasa nacional en tres veces (2,6 por cien mil hab.). |
| Aisén | Presentó la tasa de incidencia de coqueluche más alta (9,2 por cien mil hab.), igual posición que tenía en igual período del año pasado. |
| Magallanes | Junto con Tarapacá y Antofagasta ocupó los primeros lugares en riesgo para sífilis, con una tasa de 26,7 por cien mil hab. (segundo lugar). |