

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO N°7
VIGILANCIA CENTINELA IRAG EN
CONTEXTO DE SARS-CoV-2
(COVID-19)**

CHILE 24 de febrero de 2022

Departamento de Epidemiología



Contenido

Resumen.	3
Objetivo del reporte.	3
Método.	3
Vigilancia centinela de la Enfermedad Tipo Influenza (ETI).	3
Vigilancia de casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG).	4
Detección y notificación de brotes de ETI o IRAG.	4
Situación epidemiológica	5
Vigilancia centinela ETI	5
Vigilancia Centinela IRAG.	7
Brotos y otros eventos	10
Referencias	11

Resumen.

- La tasa de notificación de ETI en APS en la semana epidemiológica (SE) 7 de 2022 se observó en el límite superior del umbral de alerta epidémico, manteniéndose según los niveles basales de actividad para esta época del año con un valor de 3,1 casos por cada 100.000 habitantes. Destacan aumentos de notificación en la región de Valparaíso y Antofagasta y Arica y Parinacota.
- El número de casos IRAG y asociados al virus SARS-CoV-2 mantiene respecto a las últimas tres semanas. La positividad de SARS-CoV-2 dentro de las IRAG fue de un 71.1% para la SE 7. No se observó tendencia al aumento de fallecidos respecto de semanas anteriores. A nivel macrozona los centinelas IRAG de la región centro y centro sur de Chile representan la mayor proporción de notificaciones.
- En la SE 7 se observa circulación viral de Influenza A(H3N2) tanto en ETI como IRAG, mientras que no se observan casos ETI o IRAG asociados a VRS.

Objetivo del reporte.

Describir la información actualizada de la vigilancia centinela ETI e IRAG en el contexto de SARS-CoV-2 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 19 de febrero de 2022, SE 7. La información se entrega a nivel país.

Método.

El presente informe es un análisis descriptivo en base a la información proveniente de los componentes de la vigilancia establecidos en la Circular de Influenza de 2010 (1) y que de acuerdo con el DS N° 07/19 es de notificación obligatoria mediante modalidad centinela. Para el análisis se consideraron las siguientes definiciones:

Vigilancia centinela de la Enfermedad Tipo Influenza (ETI).

Se notifica todo paciente con fiebre (> a 38,5°C) y tos, asociado a algunos de los siguientes síntomas: mialgias, odinofagia o cefalea. La vigilancia es realizada en 43 centros de atención primaria (APS) del país, 23 de ellos tienen confirmación etiológica en una muestra de casos notificados para virus respiratorios a través de Inmunofluorescencia (IF). Se calculan tasas a nivel nacional y regional por SE, en base a población inscrita. Se presentan los niveles esperados de la curva epidémica a través de la metodología de umbrales de alerta (2). Se calcula positividad para influenza por SE y global en base al total de muestras ETI analizadas. La fuente de información es el registro de vigilancia ETI del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (MINSAL) y el Registro Filemaker para la vigilancia de virus respiratorios del Instituto de Salud Pública (ISP).

Vigilancia de casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG).

Se estudia a toda persona que requiera hospitalización por fiebre igual o superior a 38°C y tos, asociada a dificultad respiratoria (criterio clínico). En todos los casos se toma una muestra para virus respiratorios por IF y se confirma por reacción de polimerasa en cadena en tiempo real (RT-PCR). La fuente de información es el sistema en línea para vigilancia centinela de IRAG del Depto. de Epidemiología del MINSAL y Organización Panamericana de Salud (OPS): PAHOFLU. La vigilancia se realiza en 9 hospitales de alta complejidad de Puerto Montt (1), Temuco (1), Concepción (1), Viña del Mar (1), Santiago (2), Iquique (1), Antofagasta (1) y Magallanes (1). Se presentan los umbrales de alerta según la metodología de umbrales de alerta (2).

Detección y notificación de brotes de ETI o IRAG.

Ocurrencia de conglomerados de casos (2 o más) de enfermedad respiratoria tipo influenza en ambientes institucionales, que puedan constituir una situación de riesgo epidemiológico por la condición en que se encuentran. Su notificación es Universal según el DS 7/19, está orientado a la detección y control oportuno de brotes. La fuente de información es el Registro de Brotes de Enfermedades de Notificación Obligatoria en Filemaker del Departamento de Epidemiología del MINSAL.

Para la gestión de los datos, se utilizó el software Microsoft Excel 2016.

Este informe, no vulnera la Ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, ya que el Ministerio de Salud obtiene toda la información dando cumplimiento a su rol según las siguientes leyes previas: DFL N° 1/2005 del MINSAL y Ley N°19.628 sobre datos sensibles.


Situación epidemiológica

Vigilancia centinela ETI

En la SE 7, la notificación de ETI en atención primaria alcanzó 3,1 casos por 100.000 habitantes, ubicándose en el límite del umbral de alerta y manteniéndose en comparación con la semana anterior (Figura 1). Las regiones con mayor tasa de notificación fueron Valparaíso, Antofagasta y Arica y Parinacota con 12,3, 5,6 y 2,5 casos por cien mil habitantes respectivamente (Tabla 1).

A partir de la SE 52 se detectó circulación de Influenza A en los centinelas ETI, observándose en la SE 7 circulación de influenza en centinelas ETI de la región Metropolitana (n=9 muestras tomadas a nivel nacional). La positividad global para virus respiratorios fue de un 11%. La positividad para influenza fue de un 11% (Figura 2).

Figura 1. Notificación de Enfermedad Tipo Influenza en establecimientos de salud de Atención Primaria según Semana Epidemiológica. Chile, SE 7 de 2022 (comparado con 2017-2021)




Fuente: Vigilancia centinela ETI. Depto. Epidemiología MINSAL

Tabla 1. Distribución de casos ETI, según región de notificación. Chile, SE 7, año 2022.

Región	Nº Casos	Población*	Tasas x 100.000 hab
Arica-Parinacota	1	40533	2,5
Tarapacá*	0	110769	0,0
Antofagasta	7	125105	5,6
Atacama	0	24318	0,0
Coquimbo	0	69102	0,0
Valparaíso	34	277216	12,3
Metropolitana	1	255201	0,4
O'Higgins	0	44747	0,0
Maule	1	124351	0,8
Ñuble	0	55645	0,0
Bío Bío*	0	104861	0,0
Araucanía	0	87540	0,0
Los Ríos	1	52019	1,9
Los Lagos	3	145990	2,1
Aisén*	0	17483	0,0
Magallanes*	0	32930	0,0
País	48	1567810	3

Fuente: Vigilancia centinela ETI. Depto. Epidemiología MINSAL
Tasa por 100.000 habitantes en base a población inscrita
*datos preliminares

Figura 2. Notificación de vigilancia de virus respiratorios en establecimientos de salud de Atención Primaria (ETI) según Semana Epidemiológica. Chile, años 2021- 2022 (SE 7)




Fuente: Vigilancia centinela ETI. Depto. Epidemiología MINSAL

Vigilancia Centinela IRAG.

Hasta la semana epidemiológica 7 del 2022 se han registrado un total acumulado de 1166 IRAG en los centinelas del país. En la SE 5 se observa un leve aumento en las notificaciones de los casos IRAG con 219 casos notificados, el cual disminuye en la SE 6 y 7. Del total de estos casos, un 92% posee una muestra para análisis virológico con una positividad global acumulada del 47,1% para virus respiratorios. Se han registrados casos IRAG asociados a todos los virus respiratorios en vigilancia (ver Figura 3), destaca en la SE 7 la positividad a SARS-CoV-2 del 71,1%, mientras que la positividad de influenza A es de 18,2%.


Figura 3. Casos de IRAG según virus respiratorios y semana epidemiológica en hospitales centinelas IRAG. Chile, 2018- 2022 (SE 7)



Fuente: Vigilancia centinela IRAG. Depto. Epidemiología MINSAL

Del total de casos IRAG asociados a influenza A(H3N2) reportados hasta la SE 7, la tendencia en cuanto a grupo de edad se ve reflejada en los extremos de edad como los mayores de 60 años y menores de 2 años seguidos por el grupo de edad de 20 a 39 años, con un bajo ingreso a UPC. La positividad acumulada de influenza dentro del total de virus analizados es del 11,1% (Figura 4).


Figura 4. Casos de IRAG asociados a influenza y semana epidemiológica en hospitales centinelas IRAG. Chile, años 2018 – 2022 SE 7.



Fuente: Vigilancia centinela IRAG. Depto. Epidemiología MINSAL

En cuanto a casos IRAG asociados a VRS se han detectado de forma acumulada 36 casos en el año 2022, principalmente en Biobío, Los Lagos, Valparaíso, con 11 casos ingresados a UPC hasta la SE 7 y 1 fallecido a la fecha. Se mantiene tendencia al descenso del brote que comenzó tardíamente en 2021 a partir de la SE 28 (Figura 5).


Figura 5. Casos de IRAG asociados a VRS y semana epidemiológica en hospitales centinelas IRAG. Chile, años 2018 – 2022 SE 7.



Fuente: Vigilancia centinela IRAG. Depto. Epidemiología MINSAL

En los hospitales centinela para la vigilancia IRAG en las últimas dos semanas de un total de 159 y 101 IRAG analizadas se detectaron 69 y 27 casos asociados a SARS-CoV-2 respectivamente. La positividad alcanza un 71,1%, similar a las últimas tres semanas (Figura 6).

Figura 6. Casos de IRAG asociados a SARS-CoV-2 y semana epidemiológica en hospitales centinelas IRAG. Chile, años 2020 – 2022 SE 7.




Fuente: Vigilancia centinela IRAG. Depto. Epidemiología MINSAL

Hasta la SE 7 del año en curso se observa una disminución en el número de notificaciones IRAG en todos los grupos etarios en referencia a la semana anterior, concentrando la mayor cantidad de casos totales en el grupo etario de mayores de 60 años (Figura 7). En el caso de las IRAG asociadas a SARS-CoV-2 se observó un descenso en las notificaciones respecto a la semana anterior y los casos se presentan en los grupos etarios de mayores de 60 años, 40 a 59 años y menores de 2 años (figura 8). Se han confirmado 441 IRAG asociadas a SARS-CoV-2 durante 2022.


El porcentaje de IRAG sobre el total de ingresos hospitalarios para la SE 7 fue de un 6,4%. Además, un 12,0% del total de ingresos a UCI en los hospitales centinelas correspondieron a IRAG. La letalidad intrahospitalaria acumulada asociada a SARS-CoV-2 que correspondió al virus de mayor circulación fue un 19% (Tabla 2).

Figura 7. Distribución total de casos IRAG en Hospitales centinela IRAG según grupos de edad y semana de ocurrencia. Chile, años 2020- 2022 SE 7.



Fuente: Vigilancia centinela IRAG. Depto. Epidemiología MINSAL

Figura 8. Distribución de los casos IRAG SARS-CoV-2 positivos, por grupos de edad en Hospitales centinela IRAG. Chile, años 2020 – 2022 SE 7.



Fuente: Vigilancia centinela IRAG. Depto. Epidemiología MINSAL

Tabla 2. Indicadores de gravedad intrahospitalaria de casos de la vigilancia centinela IRAG según agentes virales involucrados. Chile, SE 7, 2022.

2022 (SE 1-6)	IA (H1N1) pdm09	IA H3N2	IB	IA Sin subtipificación	VRS	SARS- CoV-2	% SARS-CoV-2	% Influenza
IRAG	0	19	1	2	36	441	-	-
IRAG en UCI		4			11	105	24%	18%
Letalidad		4			1	85	19%	18%
F Riesgo		15			-	362	82%	68%
> 60 años		10			-	293	66%	45%
40-59 años		0			-	83	19%	0%
20-39 años		4			-	22	5%	18%
5-19 años		1			-	8	2%	5%
2-<5 años		0			-	2	0%	0%
0-<2 años		7			-	32	7%	32%

Fuente: Vigilancia centinela IRAG. Depto. Epidemiología MINSAL

Brotos y otros eventos

Durante el 2022 se han reportado 3 brotes de VRS asociado a población pediátrica. Uno en Coquimbo (SE 1) y dos en Biobío (SE 4 y 5).

Referencias

1. **Chile, Ministerio de Salud.** [En línea] <http://epi.minsal.cl/influenza-vigilancia/>. Circular B51/Nº20. Circular de vigilancia epidemiológica influenza estacional y pandémica (H1N1). Santiago, 14 de mayo de 2010.
2. **Global Epidemiological Surveillance Standards for influenza, 2013, WHO Capítulo 10.** [En línea] https://www.who.int/influenza/resources/documents/WHO_Epidemiological_Influenza_Surveillance_Standards_2014.pdf?ua=1 .