

INFORME EPIDEMIOLÓGICO N° 52
INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE CASOS COVID-19 SEGÚN ANTECEDENTE DE
VACUNACIÓN

CHILE 03-08-2022

Departamento de Epidemiología



Índice

Objetivo del reporte	5
Antecedentes	5
Definiciones operacionales	6
Método	7
Fuentes de información	8
Resultados: Parte 1.	9
a) Incidencia de casos confirmados de SARS-CoV-2, según estado de protección vacunal y grupos de edad. Chile, periodo 24 al 30 julio del 2022*	9
b) Incidencia de casos confirmados sintomáticos de SARS-CoV-2, según estado de protección vacunal y grupos de edad. Chile, periodo 24 al 30 julio del 2022*	9
c) Incidencia de casos confirmados de SARS-CoV-2 ingresados a hospitalización según estado de protección vacunal y grupos de edad. Chile, periodo 24 al 30 julio del 2022*	10
d) Incidencia de casos confirmados de SARS-CoV-2 ingresados a UCI según estado de protección vacunal y grupos de edad. Chile, periodo 24 al 30 julio del 2022*	10
e) Tasa de mortalidad de casos confirmados de SARS-CoV-2, según estado de protección vacunal y grupos de edad. Chile, periodo 24 al 30 julio del 2022*	11
Resultados: Parte 2.	11
a) Distribución de la frecuencia relativa porcentual del estado de vacunación del caso confirmado por COVID-19, según semana epidemiológica de inicio de síntomas. Chile, SE 1 del año 2021 a 30 del año 2022	11
b) Distribución de la frecuencia absoluta del estado de vacunación del caso confirmado por COVID-19, según semana epidemiológica de inicio de síntomas. Chile, SE 1 del año 2021 a 30 del año 2022	12
c) Distribución de la frecuencia relativa porcentual del estado de vacunación del caso confirmado ingresado a hospitalización por COVID-19, según semana epidemiológica de ingreso a hospitalización. Chile, SE 1 del año 2021 a 30 del año 2022	12
d) Distribución de la frecuencia absoluta del estado de vacunación del caso confirmado ingresado a hospitalización por COVID-19, según semana epidemiológica de ingreso a hospitalización. Chile, SE 1 del año 2021 a 30 del año 2022	13
e) Distribución de la frecuencia relativa porcentual del estado de vacunación del caso confirmado ingresado a UCI por COVID-19, según semana epidemiológica de ingreso a UCI. Chile, SE 1 del año 2021 a 30 del año 2022	13
f) Distribución de la frecuencia absoluta del estado de vacunación del caso confirmado ingresado a UCI por COVID-19, según semana epidemiológica de ingreso a UCI. Chile, SE 1 del año 2021 a 30 del año 2022	14
g) Distribución de la frecuencia relativa porcentual del estado de vacunación del caso confirmado fallecido por COVID-19, según semana epidemiológica de defunción. Chile, SE 1 del año 2021 a 30 del año 2022	14
h) Distribución de la frecuencia absoluta del estado de vacunación del caso confirmado fallecido por COVID-19, según semana epidemiológica de defunción. Chile, SE 1 del año 2021 a 30 del año 2022	15
Referencias	28

Resumen:

- La incidencia de casos sin protección o con protección incompleta fue de 259,9 casos por cien mil habitantes. La incidencia en el grupo con protección completa, vacunado entre los 14 días y 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 171,6. La incidencia en el grupo con protección completa, vacunado en un periodo mayor a 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 140,8. La incidencia en el grupo con 1º dosis de refuerzo, vacunado entre los 14 días y 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 147,3. La incidencia del grupo con 1º dosis de refuerzo, vacunado en un periodo mayor a 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 169,2. La incidencia del grupo con 2º dosis de refuerzo, vacunado entre los 14 días y 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 217,3. La incidencia del grupo con 2º dosis de refuerzo, vacunado en un periodo mayor a 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 428,0.
- Con respecto a la incidencia de casos sintomáticos sin protección o con protección incompleta fue de 157,2 casos por cien mil habitantes. La incidencia en el grupo con protección completa, vacunado entre los 14 días y 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 111,4. La incidencia en el grupo con protección completa, vacunado en un periodo mayor a 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 98,0. La incidencia en el grupo con 1º dosis de refuerzo, vacunado entre los 14 días y 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 91,5. La incidencia del grupo con 1º dosis de refuerzo, vacunado en un periodo mayor a 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 108,5. La incidencia del grupo con 2º dosis de refuerzo, vacunado entre los 14 días y 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 125,2. La incidencia del grupo con 2º dosis de refuerzo, vacunado en un periodo mayor a 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 278,4.
- La incidencia de casos ingresados a hospitalización en el grupo sin protección o con protección incompleta fue de 4,2 casos por cien mil habitantes. La incidencia en el grupo con protección completa, vacunado entre los 14 días y 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 7,5. La incidencia en el grupo con protección completa, vacunado en un periodo mayor a 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 2,8. La incidencia en el grupo con 1º dosis de refuerzo, vacunado entre los 14 días y 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 3,2. La incidencia del grupo con 1º dosis de refuerzo, vacunado en un periodo mayor a 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 2,4. La incidencia del grupo con 2º dosis de refuerzo, vacunado entre los 14 días y 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 1,3. La incidencia del grupo con 2º dosis de refuerzo, vacunado en un periodo mayor a 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 3,8.
- Respecto a la incidencia de casos ingresados a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el grupo sin protección o con protección incompleta fue de 0,3 casos por cien mil habitantes. La incidencia en el grupo con protección completa, vacunado entre los 14 días y 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 0,1. La incidencia en el grupo con protección completa, vacunado en un periodo mayor a 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 0,5. La incidencia en el grupo con 1º dosis de refuerzo, vacunado entre los 14 días y 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 0,3. La incidencia del grupo con 1º dosis de refuerzo, vacunado en un periodo mayor a 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 0,2. La incidencia del grupo con 2º dosis de refuerzo, vacunado entre los 14 días y 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 0,2. La incidencia del grupo con 2º dosis de refuerzo, vacunado en un periodo mayor a 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 1,0.

- La tasa de mortalidad en el grupo sin protección o con protección incompleta fue de 1,1 casos por cien mil habitantes. La tasa de mortalidad en el grupo con protección completa, vacunado entre los 14 días y 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 1,2. La tasa de mortalidad en el grupo con protección completa, vacunado en un periodo mayor a 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 1,1. La tasa de mortalidad en el grupo con 1º dosis de refuerzo, vacunado entre los 14 días y 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 0,7. La tasa de mortalidad del grupo con 1º dosis de refuerzo, vacunado en un periodo mayor a 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 0,8. La tasa de mortalidad del grupo con 2º dosis de refuerzo, vacunado entre los 14 días y 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 0,3. La tasa de mortalidad del grupo con 2º dosis de refuerzo, vacunado en un periodo mayor a 6 meses previos al inicio los síntomas o de toma de muestras fue de 0,5.

Objetivo del reporte:

Describir la situación epidemiológica de los casos confirmados por SARS-CoV-2 en Chile en mayores de 3 años, considerando la protección atribuible a la vacunación en distintos grupos etarios y gravedad de los casos.

Antecedentes:

Una de las principales estrategias para la mitigación de la pandemia por la COVID-19 es la vacunación. Se han realizado grandes esfuerzos en el desarrollo de vacunas efectivas y seguras contra el SARS-CoV-2 con distintos tipos de plataformas de producción tales como virus inactivados, virus vivo atenuado, vacunas de subunidades proteicas, vacunas de ácido nucleico como ARNm y ADN, vacunas vectoriales no replicantes utilizando un virus como transportador (adenovirus de humanos y chimpancé) (Dong et al., 2020).

La primera vacuna en llegar a Chile fue BNT162b2® de los laboratorios Pfizer y BioNTech (EE. UU/ Alemania), una vacuna ARNm, aprobada para su uso en personas mayores a 16 años. La segunda vacuna implementada fue CoronoVac® del Laboratorio Sinovac Life Sciences, en base a virus inactivado, en personas mayores de 18 años. Posteriormente, se han implementado las vacunas ChAdOx1-S, recombinante, de laboratorio AstraZeneca, en hombres mayores de 45 años y en mujeres mayores de 55 años, y Convidecia Suspensión inyectable (Ad5-nCoV recombinante) de CanSino Biologics Inc para personas entre 18 y 60 años. Desde el 24 de diciembre del 2020 se ha realizado una implementación gradual de diferentes plataformas de vacunas. En la primera etapa se definió la vacunación enfocada en el personal de salud de las Unidades de Paciente Crítico (UPC), según la recomendación de priorización entregada por Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (CAVEI) (CAVEI, 2020). Desde el 02 de febrero del 2021 se inició la administración de la vacuna CoronaVac® en las 16 regiones del país. Desde el 28 de abril se comenzó la administración de la vacuna AstraZeneca, y desde el 31 de mayo se inició la inoculación con vacunas de CanSino Biologics Inc, con un esquema de dosis única, a diferencia de las de Pfizer y BioNTech, Sinovac Life Sciences y AstraZeneca, cuyo esquema requiere de dos dosis. A partir del 11 de agosto de 2021 se administra una dosis de refuerzo a aquellas personas que recibieron esquema completo de vacuna Coronavac, definiendo un intervalo de 4 meses entre la segunda dosis del esquema y la dosis de refuerzo en población general y para inmunocomprometidos se consideró un mínimo de 2 meses.

Los objetivos generales de la campaña de vacunación contra SARS-CoV-2 en Chile son preservar la integridad de los servicios asistenciales, las funciones críticas que permiten mantener la infraestructura del país; y prevenir la mortalidad y morbilidad en subgrupos de la población, definidos por las condiciones biomédicas asociadas a mayor riesgo de muerte y complicaciones causadas o secundarias a infección por coronavirus (Ministerio de Salud, 2021). El plan nacional de vacunación contra SARS-CoV-2 contempla en la actualidad población objetivo desde los 3 años de edad.

Los resultados de la vacunación en cuanto a incidencia de casos, hospitalizaciones y mortalidad por la COVID-19 debe ser instaurado como aproximación para evaluar la efectividad en la población crítica, en la población de riesgo y en la población general.

Este informe descriptivo no considera aspectos sobre seguridad de vacunas ni tampoco es un análisis de la efectividad de las vacunas.

Definiciones operacionales:

- **Caso confirmado:** Persona que cumple los criterios de definición de caso confirmado según cuadro clínico (Ordinario B51 / N°269 del 19 de enero de 2022).
- **Protección incompleta (esquema incompleto) o sin protección:** Persona que no cuenta con protección completa conferida por la vacuna, ya que no ha sido vacunada o ha sido vacunada pero que aún no han transcurrido más de 14 días desde la segunda dosis (en vacunas con dos dosis) o desde la vacunación para quienes fueron inoculados con una dosis (esquema de dosis única).
- **Protección completa (esquema completo) entre 14 días y 6 meses:** Persona que cuenta con protección completa conferida por la vacuna, ya que ha sido inoculada con dos dosis y han transcurrido entre 14 días y 6 meses desde su segunda inoculación o ha recibido una vacuna de un esquema de vacunación que incluye únicamente una sola dosis y han transcurrido entre 14 días y 6 meses desde la inoculación.
- **Protección completa (esquema completo) mayor a 6 meses:** Persona que cuenta con protección completa conferida por la vacuna, ya que ha sido inoculada con dos dosis y han transcurrido más de 6 meses desde su segunda inoculación o ha recibido una vacuna de un esquema de vacunación que incluye únicamente una sola dosis y han transcurrido más de 6 meses desde la inoculación.
- **1° Dosis refuerzo entre 14 días y 6 meses:** Caso confirmado que al iniciar síntomas (sintomáticos) o toma de muestra (asintomáticos) ha recibido una dosis de refuerzo a su esquema completo y han transcurrido entre 14 días y 6 meses desde la tercera dosis.
- **1° Dosis refuerzo mayor a 6 meses:** Caso confirmado que al iniciar síntomas (sintomáticos) o toma de muestra (asintomáticos) ha recibido una dosis de refuerzo a su esquema completo y han transcurrido más de 6 meses desde la tercera dosis.
- **2° Dosis refuerzo entre 14 días y 6 meses:** Caso confirmado que al iniciar síntomas (sintomáticos) o toma de muestra (asintomáticos) ha recibido su segunda dosis de refuerzo a su esquema completo y han transcurrido entre 14 días y 6 meses desde la cuarta dosis.
- **2° Dosis refuerzo mayor a 6 meses:** Caso confirmado que al iniciar síntomas (sintomáticos) o toma de muestra (asintomáticos) ha recibido su segunda dosis de refuerzo a su esquema completo y han transcurrido más de 6 meses desde la cuarta dosis.
- **Cobertura con esquema completa:** Estado en el cual una persona ha completado la vacunación contra COVID-19, ya sea en un esquema de una o dos dosis, independiente de los días transcurridos posterior a la última vacunación.
- **Cobertura 1° dosis de refuerzo** Estado en el cual una persona ha completado la vacunación contra COVID-19 más una dosis de refuerzo, independiente de los días transcurridos posterior a la última vacunación.
- **Cobertura 2° dosis de refuerzo** Estado en el cual una persona ha completado la vacunación contra COVID-19 más dos dosis de refuerzo, independiente de los días transcurridos posterior a la última vacunación.

Método:


Se muestran las incidencias de casos de SARS-CoV-2 confirmados, casos sintomáticos, ingreso a hospitalización, ingresos a UCI y fallecidos, para los que han completado su esquema de vacunación y los que no lo han hecho, tomando como referencia la población INE 2022, en base a proyección Censo 2017. Las incidencias también se muestran para diferentes grupos etarios, para la SE de interés (Parte 1).

En el informe además se muestra la distribución de frecuencias, relativa y absoluta, del estado de vacunación de los casos confirmados nuevos totales y sintomáticos para SARS-CoV-2, reportados en la SE correspondiente. Además, se muestra la distribución de frecuencias de los casos nuevos ingresados a hospitalización y UCI debido a COVID-19 y de las defunciones confirmadas por COVID-19 (CIE-10 U.071) según la definición de casos vigente, ocurridas durante la SE correspondiente. Es importante destacar que, para los ingresos a hospitalización, UCI y defunciones, se presentan los casos cuya fecha de ingreso a hospitalización, UCI o de defunción se encuentran dentro de la SE en consideración. Las categorías que describen el estado de vacunación corresponden a: no vacunado, esquema completo entre 14 días y 6 meses, esquema completo mayor a 6 meses, 1º dosis de refuerzo entre 14 días y 6 meses, 1º dosis de refuerzo mayor a 6 meses, 2º dosis de refuerzo entre 14 días y 6 meses y 2º dosis de refuerzo mayor a 6 meses. Para la clasificación de los casos según los diferentes estados de vacunación se consideró la distancia entre la fecha de vacunación y el inicio de síntomas en los casos sintomáticos, o la fecha de toma de muestra en aquellos asintomáticos (Parte 2).

Para la correcta interpretación de los resultados estadísticos que se presentan en este informe, es fundamental considerar que, en la medida que aumenta la cobertura de la campaña de vacunación, el porcentaje de casos confirmados, y que cuentan con un esquema de vacunación completo o refuerzo, aumentará en el tiempo. Esto último no es atribuible necesariamente a una pérdida de la efectividad de las vacunas utilizadas. De hecho, se espera que cuando se alcance el total de la cobertura en la población, el 100 % de los casos incidentes se encuentren vacunados. La Figura 1 ilustra este punto, donde se muestra que, para diferentes niveles de efectividad, la proporción de casos que se encuentra vacunados aumenta en función del porcentaje de cobertura.

A modo de ejemplo, el punto en la figura 1 muestra que para una efectividad de 70 % y cuando la cobertura de inmunización es de un 80 %, se espera que el 54,6 % de los casos nuevos tengan un esquema de vacunación completo. Esta figura se basa en un modelo matemático simple y se incluye sólo con fines explicativos. Sin embargo, no permite hacer cálculos sobre la efectividad de las vacunas.

Figura 1: Evolución del porcentaje de casos nuevos con protección completa en función de la cobertura de vacunación, según efectividad de las vacunas.



Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

Finalmente, en este informe se muestra la evolución de los casos de confirmados, ingresados a hospitalización, ingresados a UCI y fallecidos, así como de la cobertura de vacunación, desde el 1 de enero de 2021. Se presenta el promedio móvil de 7 días para casos y el número acumulado de personas que han completado el esquema de vacunación.

Para este informe los análisis se presentan según grupo de edad, considerando las siguientes agrupaciones: 3 a 5 años, 6 a 11 años, 12 a 20 años, 21 a 30 años, 31 a 40 años, 41 a 50 años, 51 a 60 años, 61 a 70 años, 71 a 80 años, y 81 y más años.

Fuentes de información:

- Registro de defunciones del Departamento de Estadística e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) hasta el 31 de julio del 2022.
- Base de datos de dosis de vacunas del DEIS, MINSAL.
- Base de datos de resultados de laboratorio y Plataforma Nacional de Toma de Muestras del 31 de julio del 2022.
- Base de datos EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del MINSAL del 31 de julio del 2022.
- Base de datos de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistencial (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección 2022 de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) en base a Censo 2017.

Otras consideraciones:

Marco normativo: Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

Nota aclaratoria: La información que se presenta corresponde a data provisoria en proceso de validación.

Resultados: Parte 1.**a) Incidencia de casos confirmados de SARS-CoV-2, según estado de protección vacunal y grupos de edad. Chile, periodo 24 al 30 julio del 2022***

Grupo edad	Sin protección o con protección incompleta		Protección completa mayor a 6 meses		Protección completa entre 14 días y 6 meses		1º Dosis de refuerzo mayor a 6 meses días		1º Dosis de refuerzo entre 14 días y 6 meses días		2º Dosis de refuerzo mayor a 6 meses		2º Dosis de refuerzo entre 14 días y 6 meses días	
	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia
03-05 años	256.723	174,1	129.673	146,5	231.281	154,4	0	0,0	89.256	57,1	0	0,0	0	0,0
06-11 años	150.828	234,7	432.568	188,9	133.113	264,4	1.609	0,0	823.788	118,0	0	0,0	233	0,0
12-20 años	46.929	517,8	328.592	182,9	61.817	168,2	377.323	185,5	744.923	189,1	1.169	85,5	710.582	145,1
21-30 años	128.150	361,3	276.372	123,7	64.082	121,7	569.068	221,9	398.578	133,2	48.898	494,9	1.570.609	263,1
31-40 años	282.321	173,6	216.577	144,5	43.140	155,3	503.780	241,6	285.484	178,6	54.064	782,4	1.739.408	345,1
41-50 años	236.835	117,8	127.518	108,2	22.670	150,0	364.139	210,6	159.099	128,2	37.762	699,1	1.708.105	312,6
51-60 años	73.739	273,9	95.856	115,8	14.123	155,8	294.274	174,7	104.644	138,6	37.148	638,0	1.763.494	267,4
61-70 años	185.520	80,3	62.756	117,9	7.140	112,0	167.026	164,6	55.253	150,2	26.550	508,5	1.334.382	248,4
71-80 años	87.608	78,8	48.373	84,8	3.553	394,0	94.746	152,0	30.124	179,3	12.511	399,6	742.186	229,1
81 años o más	86.636	58,9	51.122	109,5	2.175	275,9	64.114	174,7	19.819	196,8	3.547	479,3	292.074	255,1
Total	1.535.289	259,9	1.769.407	140,8	583.094	171,6	2.436.079	169,2	2.710.968	147,3	221.649	428,0	9.861.073	217,3

*Datos provisorios hasta 03-08-2022.

**Incidencia por 100.000 habS ajustado por edad.

La serie de datos corresponde al Producto 89 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto89>

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

b) Incidencia de casos confirmados sintomáticos de SARS-CoV-2 , según estado de protección vacunal y grupos de edad. Chile, periodo 24 al 30 julio del 2022*

Grupo edad	Sin protección o con protección incompleta		Protección completa mayor a 6 meses		Protección completa entre 14 días y 6 meses		1º Dosis de refuerzo mayor a 6 meses días		1º Dosis de refuerzo entre 14 días y 6 meses días		2º Dosis de refuerzo mayor a 6 meses		2º Dosis de refuerzo entre 14 días y 6 meses días	
	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia
03-05 años	256.723	137,9	129.673	106,4	231.281	121,5	0	0,0	89.256	32,5	0	0,0	0	0,0
06-11 años	150.828	187,0	432.568	133,4	133.113	197,6	1.609	0,0	823.788	68,8	0	0,0	233	0,0
12-20 años	46.929	336,7	328.592	131,8	61.817	103,5	377.323	116,9	744.923	113,0	1.169	0,0	710.582	77,4
21-30 años	128.150	202,9	276.372	87,9	64.082	71,8	569.068	140,8	398.578	90,1	48.898	347,7	1.570.609	161,3
31-40 años	282.321	94,6	216.577	96,0	43.140	90,4	503.780	154,2	285.484	110,7	54.064	545,6	1.739.408	202,3
41-50 años	236.835	60,0	127.518	71,4	22.670	110,3	364.139	144,5	159.099	76,1	37.762	482,0	1.708.105	173,8
51-60 años	73.739	116,6	95.856	85,5	14.123	92,0	294.274	108,1	104.644	92,7	37.148	430,7	1.763.494	155,8
61-70 años	185.520	38,8	62.756	68,5	7.140	70,0	167.026	98,2	55.253	85,1	26.550	308,9	1.334.382	136,2
71-80 años	87.608	49,1	48.373	64,1	3.553	225,2	94.746	101,3	30.124	126,1	12.511	167,9	742.186	132,3
81 años o más	86.636	38,1	51.122	76,3	2.175	183,9	64.114	118,5	19.819	126,1	3.547	197,3	292.074	142,8
Total	1.535.289	157,2	1.769.407	98,0	583.094	111,4	2.436.079	108,5	2.710.968	91,5	221.649	278,4	9.861.073	125,2

*Datos provisorios hasta 03-08-2022.

**Incidencia por 100.000 habS ajustado por edad.

La serie de datos corresponde al Producto 89 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto89>

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

c) Incidencia de casos confirmados de SARS-CoV-2 ingresados a hospitalización según estado de protección vacunal y grupos de edad. Chile, periodo 24 al 30 julio del 2022*

Grupo edad	Sin protección o con protección incompleta		Protección completa mayor a 6 meses		Protección completa entre 14 días y 6 meses		1º Dosis de refuerzo mayor a 6 meses días		1º Dosis de refuerzo entre 14 días y 6 meses días		2º Dosis de refuerzo mayor a 6 meses		2º Dosis de refuerzo entre 14 días y 6 meses días	
	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia
03-05 años	256.723	3,1	129.673	0,0	231.281	0,9	0	0,0	89.256	0,0	0	0,0	0	0,0
06-11 años	150.828	2,7	432.568	1,2	133.113	0,0	1.609	0,0	823.788	0,1	0	0,0	233	0,0
12-20 años	46.929	2,1	328.592	1,8	61.817	3,2	377.323	0,0	744.923	1,2	1.169	0,0	710.582	0,0
21-30 años	128.150	8,6	276.372	0,4	64.082	3,1	569.068	2,5	398.578	1,5	48.898	2,0	1.570.609	0,9
31-40 años	282.321	2,1	216.577	0,9	43.140	0,0	503.780	0,6	285.484	1,4	54.064	0,0	1.739.408	1,1
41-50 años	236.835	3,0	127.518	0,0	22.670	4,4	364.139	2,5	159.099	3,1	37.762	2,6	1.708.105	1,1
51-60 años	73.739	4,1	95.856	6,3	14.123	0,0	294.274	1,4	104.644	3,8	37.148	5,4	1.763.494	1,2
61-70 años	185.520	5,9	62.756	12,7	7.140	42,0	167.026	9,0	55.253	7,2	26.550	11,3	1.334.382	2,4
71-80 años	87.608	8,0	48.373	12,4	3.553	56,3	94.746	15,8	30.124	26,6	12.511	24,0	742.186	8,1
81 años o más	86.636	13,9	51.122	27,4	2.175	92	64.114	21,8	19.819	25,2	3.547	84,6	292.074	16,8
Total	1.535.289	4,2	1.769.407	2,8	583.094	7,5	2.436.079	2,4	89.256	3,2	221.649	3,8	9.861.073	1,3

*Datos provisorios hasta 03-08-2022.

**Incidencia por 100.000 habS ajustado por edad.

La serie de datos corresponde al Producto 89 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto89>

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

d) Incidencia de casos confirmados de SARS-CoV-2 ingresados a UCI según estado de protección vacunal y grupos de edad. Chile, periodo 24 al 30 julio del 2022*

Grupo edad	Sin protección o con protección incompleta		Protección completa mayor a 6 meses		Protección completa entre 14 días y 6 meses		1º Dosis de refuerzo mayor a 6 meses días		1º Dosis de refuerzo entre 14 días y 6 meses días		2º Dosis de refuerzo mayor a 6 meses		2º Dosis de refuerzo entre 14 días y 6 meses días	
	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia
03-05 años	256.723	0,4	129.673	0,0	231.281	0,0	0	0,0	89.256	0,0	0	0,0	0	0,0
06-11 años	150.828	0,0	432.568	0,0	133.113	0,0	1.609	0,0	823.788	0,0	0	0,0	233	0,0
12-20 años	46.929	0,0	328.592	0,0	61.817	0,0	377.323	0,0	744.923	0,0	1.169	0,0	710.582	0,0
21-30 años	128.150	0,0	276.372	0,0	64.082	0,0	569.068	0,2	398.578	0,0	48.898	0,0	1.570.609	0,0
31-40 años	282.321	0,7	216.577	0,0	43.140	0,0	503.780	0,0	285.484	0,0	54.064	0,0	1.739.408	0,1
41-50 años	236.835	0,0	127.518	0,0	22.670	0,0	364.139	0,3	159.099	0,0	37.762	0,0	1.708.105	0,1
51-60 años	73.739	1,4	95.856	0,0	14.123	0,0	294.274	0,7	104.644	1,0	37.148	2,7	1.763.494	0,3
61-70 años	185.520	0,0	62.756	4,8	7.140	14,0	167.026	0,0	55.253	3,6	26.550	7,5	1.334.382	0,6
71-80 años	87.608	1,1	48.373	4,1	3.553	28,1	94.746	2,1	30.124	0,0	12.511	8,0	742.186	1,5
81 años o más	86.636	1,2	51.122	2,0	2.175	0,0	64.114	1,6	19.819	0,0	3.547	0,0	292.074	1,4
Total	1.535.289	0,3	1.769.407	0,5	583.094	0,1	2.436.079	0,2	2.710.968	0,3	221.649	1,0	9.861.073	0,2

*Datos provisorios hasta 03-08-2022.

**Incidencia por 100.000 habS ajustado por edad.

La serie de datos corresponde al Producto 89 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto89>

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

e) Tasa de mortalidad de casos confirmados de SARS-CoV-2, según estado de protección vacunal y grupos de edad. Chile, periodo 24 al 30 julio del 2022*

Grupo edad	Sin protección o con protección incompleta		Protección completa mayor a 6 meses		Protección completa entre 14 días y 6 meses		1° Dosis de refuerzo mayor a 6 meses días		1° Dosis de refuerzo entre 14 días y 6 meses días		2° Dosis de refuerzo mayor a 6 meses		2° Dosis de refuerzo entre 14 días y 6 meses días	
	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia	Población	Incidencia
03-05 años	256.723	0,0	129.673	0,0	231.281	0,0	0	0,0	89.256	0,0	0	0,0	0	0,0
06-11 años	150.828	0,0	432.568	0,0	133.113	0,0	1.609	0,0	823.788	0,0	0	0,0	233	0,0
12-20 años	46.929	0,0	328.592	0,0	61.817	0,0	377.323	0,0	744.923	0,0	1.169	0,0	710.582	0,0
21-30 años	128.150	0,0	276.372	0,0	64.082	0,0	569.068	0,2	398.578	0,0	48.898	0,0	1.570.609	0,0
31-40 años	282.321	0,0	216.577	0,5	43.140	0,0	503.780	0,0	285.484	0,0	54.064	0,0	1.739.408	0,0
41-50 años	236.835	0,8	127.518	0,8	22.670	0,0	364.139	0,5	159.099	0,6	37.762	0,0	1.708.105	0,1
51-60 años	73.739	2,7	95.856	1,0	14.123	7,1	294.274	0,7	104.644	1,0	37.148	2,7	1.763.494	0,2
61-70 años	185.520	2,2	62.756	3,2	7.140	0,0	167.026	2,4	55.253	0,0	26.550	3,8	1.334.382	0,3
71-80 años	87.608	9,1	48.373	10,3	3.553	0,0	94.746	3,2	30.124	6,6	12.511	0,0	742.186	2,6
81 años o más	86.636	20,8	51.122	17,6	2.175	46,0	64.114	10,9	19.819	25,2	3.547	0,0	292.074	14,0
Total	1.535.289	1,1	1.769.407	1,1	583.094	1,2	2.436.079	0,8	2.710.968	0,7	221.649	0,5	9.861.073	0,3

*Datos provisorios hasta 03-08-2022.

**Incidencia por 100.000 hab. ajustado por edad.


La serie de datos corresponde al Producto 89 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto89>

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

El presente informe corrige y actualiza los denominadores poblacionales del informe 51 para las estimaciones de tasas por grupo de edad y semana de interés, considerando el esquema de vacunación administrado y tiempo transcurrido desde la administración de la vacuna hasta la fecha de inicio de síntomas y/o toma de muestra (para casos asintomáticos)

Resultados: Parte 2.

a) Distribución de la frecuencia relativa porcentual del estado de vacunación del caso confirmado por COVID-19, según semana epidemiológica de inicio de síntomas. Chile, SE 1 del año 2021 a 30 del año 2022




Datos provisorios hasta 29.

La serie de datos corresponde al Producto 90 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto90/incidencia_en_vacunados.csv

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

b) Distribución de la frecuencia absoluta del estado de vacunación del caso confirmado por COVID-19, según semana epidemiológica de inicio de síntomas. Chile, SE 1 del año 2021 a 30 del año 2022




Datos provisorios hasta 03-08-2022.

La serie de datos corresponde al Producto 90 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto90/incidencia_en_vacunados.csv

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

c) Distribución de la frecuencia relativa porcentual del estado de vacunación del caso confirmado ingresado a hospitalización por COVID-19, según semana epidemiológica de ingreso a hospitalización. Chile, SE 1 del año 2021 a 30 del año 2022




Datos provisorios hasta 03-08-2022.

La serie de datos corresponde al Producto 90 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto90/incidencia_en_vacunados.csv

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

d) Distribución de la frecuencia absoluta del estado de vacunación del caso confirmado ingresado a hospitalización por COVID-19, según semana epidemiológica de ingreso a hospitalización. Chile, SE 1 del año 2021 a 30 del año 2022




Datos provisorios hasta 03-08-2022.

La serie de datos corresponde al Producto 90 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto90/incidencia_en_vacunados.csv

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

e) Distribución de la frecuencia relativa porcentual del estado de vacunación del caso confirmado ingresado a UCI por COVID-19, según semana epidemiológica de ingreso a UCI. Chile, SE 1 del año 2021 a 30 del año 2022




Datos provisorios hasta 03-08-2022.

La serie de datos corresponde al Producto 90 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto90/incidencia_en_vacunados.csv

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

f) Distribución de la frecuencia absoluta del estado de vacunación del caso confirmado ingresado a UCI por COVID-19, según semana epidemiológica de ingreso a UCI. Chile, SE 1 del año 2021 a 30 del año 2022




Datos provisorios hasta 03-08-2022.

La serie de datos corresponde al Producto 90 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto90/incidencia_en_vacunados.csv

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

g) Distribución de la frecuencia relativa porcentual del estado de vacunación del caso confirmado fallecido por COVID-19, según semana epidemiológica de defunción. Chile, SE 1 del año 2021 a 30 del año 2022




Datos provisorios hasta 03-08-2022.

La serie de datos corresponde al Producto 90 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto90/incidencia_en_vacunados.csv

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

h) Distribución de la frecuencia absoluta del estado de vacunación del caso confirmado fallecido por COVID-19, según semana epidemiológica de defunción. Chile, SE 1 del año 2021 a 30 del año 2022



Datos provisorios hasta 03-08-2022.

La serie de datos corresponde al Producto 90 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto90/incidencia_en_vacunados.csv


Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

Nota Aclaratoria: Para una mejor visualización, las cifras asociadas a cada barra y semana han sido omitidas dentro de la figura, y puestas a disposición en el link señalado al pie de cada una de ellas.

Anexo 1: Casos confirmados COVID-19, sintomáticos, ingreso a hospitalizaciones, ingresos a UCI y fallecidos según grupos etarios y coberturas de vacunación.


1.1 Población total mayor de 3 años, según INE 2022 en base a proyección Censo 2017

Media Móvil 7 días casos COVID-19 y Cobertura de Vacunación




Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2022, en base a proyección Censo 2017

Media Móvil 7 días casos sintomáticos COVID-19 y Cobertura de Vacunación




Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2022, en base a proyección Censo 2017

Media Móvil 7 días ingreso de casos COVID-19 a Hospitalización y Cobertura de Vacunación




Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2022, en base a proyección Censo 2017

Media Móvil 7 días ingreso de casos COVID-19 a UCI y Cobertura de Vacunación




Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2022, en base a proyección Censo 2017

Media Móvil 7 días Fallecidos COVID-19 y Cobertura de Vacunación



Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2022, en base a proyección Censo 2017


1.2 Población entre 6 y 11 años, según INE 2022 en base a proyección Censo 2017




Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2022, en base a proyección Censo 2017



Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2022, en base a proyección Censo 2017



Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2022, en base a proyección Censo 2017








Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2022, en base a proyección Censo 2017








Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2022, en base a proyección Censo 2017






1.3 Población entre 12 y 20 años, según INE 2022 en base a proyección Censo 2017








1.4 Población entre 21 y 30 años, según INE 2022 en base a proyección Censo 2017




1.5 Población entre 31 y 40 años, según INE 2022 en base a proyección Censo 2017




1.6 Población entre 41 y 50 años, según INE 2022 en base a proyección Censo 2017








1.7 Población entre 51 y 60 años, según INE 2022 en base a proyección Censo 2017








1.8 Población entre 61 y 70 años, según INE 2022 en base a proyección Censo 2017



1.9 Población entre 71 y 80 años, según INE 2022 en base a proyección Censo 2017




2.0 Población mayor de 81 años, según INE 2022 en base a proyección Censo 2017




Anexo 2: Tendencia de la tasa de incidencia ajustada de casos confirmados COVID-19, sintomáticos, ingresos a UCI y fallecidos según semana epidemiológica.


2.1 Tendencia de la tasa de incidencia de casos confirmados




2.2 Tendencia de la tasa de incidencia de casos confirmados por rango etario




2.3 Tendencia de la tasa de incidencia de casos sintomáticos




2.4 Tendencia de la tasa de incidencia de casos sintomáticos po rango etario




2.5 Tendencia de la tasa de incidencia de ingresos a hospitalización




2.6 Tendencia de la tasa de incidencia de ingresos a hospitalización por rango etario




2.7 Tendencia de la tasa de incidencia de ingresos a UCI




2.8 Tendencia de la tasa de incidencia de ingresos a UCI por rango etario



2.9 Tendencia de la tasa de mortalidad



2.10 Tendencia de la tasa de mortalidad por rango etario



Referencias

- Comité Asesor en Vacunas y Estrategia de Inmunización. Recomendaciones para priorizar la vacunación contra SARS-CoV-2 en personal de salud durante la fase de inicio de campaña y en contexto de suministro limitado de vacunas. Chile, 2020. Disponible en: https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/12/CAVEI-Subpriorizacion-personal-salud_15Dic2020.pdf
- Dong Y, Dai T, Wei Y, Zhang L, Zheng M, Zhou F. A systematic review of SARS-CoV-2 vaccine candidates. *Signal Transduct Target Ther.* 2020 Oct 13;5(1):237. doi: 10.1038/s41392-020-00352-y
- Instituto de Salud Pública. Instituto de Salud Pública de Chile, 2020. Disponible en: <https://www.ispch.cl/isp-covid-19/vacunas-covid-19/>
- Ministerio de Salud. Lineamientos técnicos operativos vacunación contra SARS-CoV-2. Minsal 2021. Disponible en: <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/12/RE-N%C2%BA-1138-Lineamientos-SARS-CoV-2.pdf>
- Ministerio de Salud. Dosis de refuerzo en la campaña de vacunación contra SARS-CoV-2 en Chile. Departamento de inmunizaciones, Minsal, 05 de agosto de 2021. Disponible en: <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/08/Dosis-de-refuerzo-en-la-campa%C3%B1a-de-vacunaci%C3%B3n-contr-SARS-CoV-2-en-Chile.pdf>
- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS.(2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en: [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMS.(2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>