

INFORME EPIDEMIOLÓGICO N°01
VIGILANCIA CENTINELA ETI E
IRAG DE INFLUENZA Y OTROS
VIRUS RESPIRATORIOS
CHILE 09 de enero 2024

Departamento de Epidemiología



Contenido

Resumen.	3
Objetivo del reporte.	3
Método.	3
Vigilancia centinela de la Enfermedad Tipo Influenza (ETI).	3
Vigilancia de casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG).	4
Detección y notificación de brotes de ETI o IRAG.	4
Situación epidemiológica	5
Vigilancia centinela ETI	5
Vigilancia Centinela IRAG.	7
Vigilancia universal COVID-19.....	11
Defunciones en Menores de un año.....	12
Brotos	13
Referencias	13

Resumen.

- La tasa de notificación de ETI en APS en la semana epidemiológica (SE) 1 de 2023 se observó sobre el umbral de alerta epidémico con 8,1 casos notificados por cada 100.000 habitantes. Las regiones con mayor tasa de notificación fueron Aysén, Los Lagos y Atacama.
- En ETI se detectó SARS-CoV-2, Parainfluenza, Rinovirus, Influenza A e Influenza B. La positividad global de virus respiratorios en la SE 1 en ETI fue de 46,5% mientras que la positividad de influenza fue de 7,0%.
- En la SE 1 se presentaron casos IRAG asociados a Rinovirus principalmente en los grupos etarios de mayores de 60 años. Se observó un 3,6% de casos IRAG dentro del total de hospitalizados y un 6,9% de casos IRAG dentro del total de ingresos UCI en todos los centinelas.
- En la SE 1 la positividad global de virus respiratorios fue del 65,9% y se presentaron casos asociados a Rinovirus con una positividad de 31,7%, Parainfluenza con 14,6%, Adenovirus con 14,6%, SARS-CoV-2 con 11,9%, VRS con 4,9%, Metapneumovirus con 4,9%, Influenza A con 2,4%, Influenza B con 2,4% y Coronavirus con 2,4%.
- En la SE 1 la vigilancia universal de SARS-CoV-2 presentó un total de 2411 casos, mostrando una baja del 2% con respecto a la SE anterior (SE52). Se reportaron 16 fallecidos confirmados a SARS-CoV-2. El total de exámenes reportados a la SE1 fue de 10973 (4% mayor a la SE anterior), siendo 4589 por metodología de RT-PR y 6384 por metodología de Antígeno.
- Hasta la SE 1 del año en curso no se han registrado defunciones por infecciones de las vías respiratorias inferiores en menores de un año en hospitales.

Objetivo del reporte.

Describir la información actualizada de la vigilancia centinela ETI e IRAG en Chile, en base a datos disponibles hasta el 6 de enero 2024, SE 01. La información se entrega ~~al~~país.

Método.

El presente informe es un análisis descriptivo en base a la información proveniente de los componentes de la vigilancia establecidos en la Circular de Influenza de 2010 (1) y que de acuerdo con el DS N° 07/2019 es de notificación obligatoria mediante modalidad centinela. Para el análisis se consideraron las siguientes definiciones:

Vigilancia centinela de la Enfermedad Tipo Influenza (ETI).

Se notifica todo paciente con fiebre (> a 38,5°C) y tos, asociado a algunos de los siguientes síntomas: mialgias, odinofagia o cefalea. La vigilancia es realizada en 43 centros de atención primaria (APS) del país, 24 de ellos tienen confirmación etiológica en una muestra de casos notificados para virus respiratorios a través de Inmunofluorescencia (IF) y PCR multiplex. Se calculan tasas a nivel nacional y regional por SE, en base a población inscrita. Se presentan los niveles esperados de la curva epidémica a través de la metodología de umbrales de alerta (2). Se calcula positividad para influenza por SE y global en base a total de muestras ETI analizadas. La fuente de información es el registro de vigilancia ETI del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (MINSAL).

Vigilancia de casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG).

Se estudia a toda persona que requiera hospitalización por fiebre igual o superior a 38°C y tos, asociada a dificultad respiratoria (criterio clínico). En todos los casos se toma una muestra para virus respiratorios por IF y se confirma por reacción de polimerasa en cadena en tiempo real (RT-PCR). La fuente de información es el sistema en línea para vigilancia centinela de IRAG del Depto. de Epidemiología del MINSAL y Organización Panamericana de Salud (OPS): PAHOFLU. La vigilancia se realiza en 10 hospitales de alta complejidad de Arica y Parinacota (1), Iquique (1), Antofagasta (1), Viña del Mar (1), Santiago (2), Temuco (1), Concepción (1), Puerto Montt (1) y Magallanes (1). Se presentan los umbrales de alerta según la metodología de umbrales de alerta (2). Los centinelas de Antofagasta y Magallanes se incorporaron al análisis a partir del año 2021, mientras que Arica comenzó con la vigilancia desde la SE 26 del 2023.

Detección y notificación de brotes de ETI o IRAG.

Ocurrencia de conglomerados de casos (2 o más) de enfermedad respiratoria tipo influenza, SARS-CoV-2, VRS y otros virus respiratorios en ambientes institucionales, que puedan constituir una situación de riesgo epidemiológico por la condición en que se encuentran. Su notificación es Universal según el DS N° 7/2019, está orientado a la detección y control oportuno de brotes. La fuente de información es el Registro de Brotes de Enfermedades de Notificación Obligatoria en Filemaker del Departamento de Epidemiología del MINSAL.

Para la gestión de los datos, se utilizó el software Microsoft Excel 2016.

Este informe, no vulnera la Ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, ya que el Ministerio de Salud obtiene toda la información dando cumplimiento a su rol según las siguientes leyes previas: DFL N° 1/2005 del MINSAL y Ley N° 19.628 sobre datos sensibles.


Situación epidemiológica

Vigilancia centinela ETI

En la SE 1 la notificación de ETI en atención primaria alcanzó 8,1 casos por 100.000 habitantes, ubicándose sobre el umbral de alerta para la SE y bajo para el umbral estacional (Figura 1). Las regiones con mayor tasa de notificación fueron Aysén, Los Lagos y Atacama con 28,6 15,1 y 11,6 casos por cien mil habitantes respectivamente (Tabla 1).

En la SE 1 se detectó Influenza A en los centinelas Iquique y Antofagasta, Influenza B fue detectado en Los Lagos, y SARS-CoV-2 fue detectado en los centinelas de Iquique, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos. Además, se detectó Parainfluenza y Rinovirus en los centinelas ETI. La positividad global para virus respiratorios en la vigilancia ETI en la SE 1 fue de 46,5%, mientras que la positividad de influenza fue de 7,0% (Figura 2).

Figura 1. Notificación de Enfermedad Tipo Influenza en establecimientos de salud de Atención Primaria según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1 de 2024 (comparado con 2016-2023*)




*Se excluye años 2020, 2021 y 2022 por ser considerados años pandémicos
Fuente: Vigilancia centinela ETI. Depto. Epidemiología MINSAL

Tabla 1. Distribución de casos ETI, según región de notificación. Chile, SE 1, año 2024.

Región	Nº Casos	Población*	Tasas x 100.000 hab
Arica-Parinacota	0	40533	0,0
Tarapacá	7	75224	9,3
Antofagasta	13	124473	10,4
Atacama	3	25887	11,6
Coquimbo	3	68153	4,4
Valparaíso	8	262569	3,0
Metropolitana	33	286790	11,5
O'Higgins	5	45702	10,9
Maule	1	85724	1,2
Ñuble	2	27846	7,2
Biobío	10	132986	7,5
Araucanía	2	83501	2,4
Los Ríos	4	54453	7,3
Los Lagos*	22	145600	15,1
Aysén	5	17483	28,6
Magallanes	3	25970	11,6
País	121	1502894	8,1

Fuente: Vigilancia centinela ETI. Depto. Epidemiología MINSAL
 Tasa por 100.000 habitantes en base a población inscrita
 *datos preliminares

Figura 2. Notificación de vigilancia de virus respiratorios* en establecimientos de salud de Atención Primaria (ETI) según Semana Epidemiológica. Chile, años 2022- 2024 (SE 1)




*A partir de 2024 se incorpora Rinovirus y Otros virus respiratorios

Fuente: Vigilancia centinela ETI. Depto. Epidemiología MINSAL

Vigilancia Centinela IRAG.

Hasta la SE 1 del 2023 se han acumulado 101 IRAG en los centinelas del país. Del total de estos casos, un 94% posee una muestra para análisis virológico con una positividad global acumulada del 66% para virus respiratorios. Se han registrados casos IRAG asociados a todos los virus respiratorios en vigilancia (ver Figura 3). En la SE 1 la positividad global de virus respiratorios fue del 65,9% y se presentaron casos asociados a Rinovirus con una positividad de 31,7%, Parainfluenza con 14,6%, Adenovirus con 14,6%, SARS-CoV-2 con 11,9%, VRS con 4,9%, Metapneumovirus con 4,9%, Influenza A con 2,4%, Influenza B con 2,4% y Coronavirus con 2,4%.


Figura 3. Casos de IRAG según virus respiratorios y semana epidemiológica en hospitales centinelas IRAG. Chile, 2022 – 2024 (SE 1)



Fuente: Vigilancia centinela IRAG. Depto. Epidemiología MINSAL

En la SE 1 los casos IRAG se presentaron principalmente en los grupos etarios de mayores de 60 años (48%), seguidos por los menores de 2 años (23%) y de 2 a 4 años (12%) (Figura 4).

Figura 4. Distribución total de casos IRAG en Hospitales centinela IRAG según grupos de edad y semana de ocurrencia. Chile, años 2022- 2024 SE 1.



Fuente: Vigilancia centinela IRAG. Depto. Epidemiología MINSAL

El porcentaje de IRAG sobre el total de ingresos hospitalarios para la SE 1 fue de un 3,6%. Además, un 6,9% del total de ingresos a UCI en los hospitales centinelas correspondieron a IRAG (Tabla 2).


Tabla 2. Indicadores de gravedad intrahospitalaria de casos de la vigilancia centinela IRAG según agentes virales involucrados. Chile, SE 1, 2024.

2024 (SE 1)	IA (H1N1) pdm09	IA H3N2	IB	IA Sin subtipificación	VRS	SARS- CoV-2	% Influenza	% VRS	% SARS-CoV-2
IRAG	1	0	1	0	2	5	-	-	-
IRAG en UCI			1		0	1	50%	0%	20%
Letalidad			0		0	0	0%	0%	0%
> 60 años			0		1	4	0%	50%	80%
40-59 años			1		0	0	50%	0%	0%
20-39 años			0		0	0	0%	0%	0%
5-19 años			0		0	0	0%	0%	0%
2-<5 años			0		0	1	0%	0%	20%
0-<2 años			1		1	0	50%	50%	0%

Fuente: Vigilancia centinela IRAG. Depto. Epidemiología MINSAL

Respecto a Influenza, se han confirmado 2 casos durante el 2023 hasta la SE 1, principalmente Influenza A(H1N1) e Influenza B (Figura 5), con 1 caso ingresado a cama crítica y 0 fallecidos. Los casos se han presentado en Arica y Parinacota y Antofagasta.


Figura 5. Casos de IRAG asociados a influenza y semana epidemiológica en hospitales centinelas IRAG. Chile, años 2022 – 2024 SE 1.



Fuente: Vigilancia centinela IRAG. Depto. Epidemiología MINSAL

En la SE 1 se presentaron casos IRAG asociados a Influenza en los grupos etarios de menores de 2 años (50%) y de 40 a 59 años (50%) (Figura 6).


Figura 6. Casos de IRAG asociados a Influenza por semana epidemiológica según grupos de edad en hospitales centinelas IRAG. Chile, años 2022 – 2024 SE 1.



Fuente: Vigilancia centinela IRAG. Depto. Epidemiología MINSAL

En cuanto a casos IRAG asociados a VRS, se han detectado de forma acumulada 2 casos en el año 2024 (Figura 7) en Biobío y Los Lagos, con 0 casos ingresados a UPC y 0 fallecidos a la fecha.


Figura 7. Casos de IRAG asociados a VRS y semana epidemiológica en hospitales centinelas IRAG. Chile, años 2022 – 2024 SE 1.



Fuente: Vigilancia centinela IRAG. Depto. Epidemiología MINSAL

De los casos IRAG asociados a VRS, 1 caso se presentó en el grupo etario de 6 a 11 meses (50%) y 1 en mayores de 65 años (59%) (Figura 8).


Figura 8. Casos de IRAG asociados a VRS por semana epidemiológica según grupos de edad en hospitales centinelas IRAG. Chile, años 2022 – 2024 SE 1.



Fuente: Vigilancia centinela IRAG. Depto. Epidemiología MINSAL


Durante el año en curso se han confirmado 5 IRAG asociadas a SARS-CoV-2 (Figura 9). Se reportó que 1 caso requirió cama crítica y que 0 han fallecido.

Figura 9. Casos de IRAG asociados a SARS-CoV-2 por semana epidemiológica en hospitales centinelas IRAG. Chile, años 2022 – 2024 SE 1.



En cuanto a la distribución de casos IRAG asociadas a SARS-CoV-2, en la SE 1 se registraron casos en los grupos etarios de mayores de 60 años (80%) y de 2 a 4 años (20%) (Figura 10).


Figura 10. Distribución de los casos IRAG SARS-CoV-2 positivos, por grupos de edad en Hospitales centinela IRAG. Chile, años 2022 – 2024 SE 1.



Vigilancia universal COVID-19

En la SE 1 la vigilancia universal de SARS-CoV-2 presentó un total de 2411 casos, mostrando una baja del 2% con respecto a la SE anterior (SE52). Se reportaron 16 fallecidos confirmados a SARS-CoV-2. El total de exámenes reportados a la SE1 fue de 10973 (4% mayor a la SE anterior), siendo 4589 por metodología de RT-PR y 6384 por metodología de Antígeno (Figura 11).

Figura 11. Número de casos COVID-19 notificados en vigilancia universal por semana epidemiológica. Chile años 2023 – 2024 SE 1




Fuente: Vigilancia universal COVID-19. Depto. Epidemiología MINSAL

Defunciones en Menores de un año

Hasta la SE 1 del año en curso no se han registrado defunciones por infecciones de las vías respiratorias inferiores en menores de un año. Para identificar este grupo se utilizaron los códigos para Influenza [gripe] y neumonía (J09-J18) y Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22). Las causas básicas de defunción son preliminares para los años 2021, 2022, 2023 y 2024 y podrían estar sujetas a modificación al cierre del año estadístico (Figura 12).

Figura 12. Número de defunciones acumuladas anuales en menores de un año por Influenza y neumonía (J09-J18) y Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22). Años 2010 – 2024*.



Fuente: DEIS. *información provisional al 10/01/2024

Para facilitar la comparación entre los diferentes años, la tabla 3 muestra el número de defunciones acumuladas por infecciones de las vías respiratorias inferiores en menores de 1 año hasta la SE 1 para el período 2010-2024 (Tabla 3).

Tabla 3. Número de defunciones acumuladas a la SE 1 en menores de un año por Influenza y neumonía (J09-J18) y Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22). Chile, 2010-2024.

Año	N° defunciones a la SE 1
2010	1
2011	0
2012	0
2013	0
2014	0
2015	0
2016	1
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0
2021	1
2022	0
2023	0
2024	0

Fuente: DEIS.

Brotos

En la SE1 de 2024 se reportaron 0 brotes asociados a enfermedades respiratorias en establecimientos educacionales e instituciones cerradas.

Tabla 4. Brotes de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) notificados por región. Año 2024. SE 1

Región	N° Brotes
Arica-Parinacota	0
Tarapacá	0
Antofagasta	0
Atacama	0
Coquimbo	0
Valparaíso	0
Metropolitana	0
O'Higgins	0
Maule	0
Ñuble	0
Biobío	0
Araucanía	0
Los Ríos	0
Los Lagos	0
Aysén	0
Magallanes	0
Total	0

Fuente: Sistema Filemaker. Dpto. Epidemiología, MINSAL

Referencias

1. Chile, Ministerio de Salud. [En línea] [http://epi.minsal.cl/influenza- vigilancia/](http://epi.minsal.cl/influenza-vigilancia/). Circular B03/Nº20. Circular de vigilancia epidemiológica influenza estacional y pandémica (H1N1). Santiago, 15

de mayo de 2010.

2. Global Epidemiological Surveillance Standards for influenza, 2013, WHO Capítulo **10.**
[En línea]
https://www.who.int/influenza/resources/documents/WHO_Epidemiological_Influenza_Surveillance_Standards_2015.pdf?ua=1